

Condado de Mercer

Hoja informativa sobre el cáncer

La Coalición contra el Cáncer del Condado de Mercer debe su existencia a la subvención que otorga la Oficina para el Control y la Prevención del Cáncer del Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores de Nueva Jersey. La misión de la Coalición contra el Cáncer del Condado de Mercer es poner en práctica en este condado el Plan de Control Integral del Cáncer de Nueva Jersey. Si desea más información sobre el Control Integral del Cáncer en Nueva Jersey, visite: www.njcancer.gov

Perfil demográfico del condado 2000 versus 2006

| | 2000 ¹ | 2006 ² |
|---|-------------------|-------------------|
| Población | 350,761 | 367,605 |
| Mediana de la edad* | 36 | 37 |
| Composición racial: | | |
| Blancos (%) | 69 | 67 |
| Negros (%) | 20 | 20 |
| Asiáticos (%) | 5 | 8 |
| Composición étnica: | | |
| Hispanos (%) | 10 | 12 |
| Mediana de los ingresos por familia* | \$56,612 | \$65,305 |
| % de residentes \geq 25 años de edad que no terminaron los estudios secundarios | 18 | 15 |
| % de residentes que viven por debajo del nivel de pobreza* | 9 | 8 |

Fuentes: Oficina Estadounidense de Censos; ¹ Censo del 2000, y ² Encuesta Comunitaria Estadounidense del 2006

* Los datos correspondientes a los años 2000 y 2006 deben compararse con cautela dado que se utilizaron métodos diferentes para la recopilación de datos.

Peso general del cáncer

Entre 2000 y 2004, en el Condado de Mercer, se diagnosticó cáncer a un promedio de 626 hombres y 457 mujeres de cada 100,000 por año. Esta cifra puede compararse con la tasa de Nueva Jersey, de 614 hombres y 447 mujeres. La tasa promedio anual de mortalidad por cáncer en el Condado de Mercer fue de 226 para los hombres y de 167 para las mujeres, mientras que la tasa estatal fue de 237 y 172, respectivamente. Al igual que en el estado, los tipos de cáncer que afectan a la mayoría de las personas en el Condado de Mercer son los cánceres de próstata, de mama, de pulmón y colorrectal.

Nota: Las tasas son cada 100,000 y están ajustadas por edad a los estándares de población del Censo Estadounidense del 2000.

Temas centrales

- **Acceso y recursos:** Entre los factores que contribuyen a la imposibilidad de acceder a los recursos de atención médica en el Condado de Mercer se encuentran el transporte, el nivel socioeconómico, la falta de seguros médicos, los sistemas culturales y de creencias y la estructura familiar. La falta de seguros médicos para los residentes del condado y el reembolso deficiente a las instituciones de caridad implican grandes cargas económicas para los hospitales del condado.
- **Educación escolar sobre la salud:** Todos los sistemas escolares tratan temas relacionados con el cáncer, aunque algunos sólo superficialmente. No es obligatoria la enseñanza de pautas para protegerse del sol.
- **Cuidados paliativos:** El Condado de Mercer cuenta con cuatro programas de servicios de hospicio.
- **Nutrición y actividad física:** Varias organizaciones y hospitales del Condado de Mercer ofrecen asesoramiento o programas sobre nutrición y ejercicios físicos. Sin embargo, acceder a estos programas representa un problema para muchos residentes.
- **Cáncer infantil:** El Condado de Mercer no cuenta con servicios oncológicos pediátricos. Los cuidados paliativos se brindan a través de organizaciones locales de hospicio.
- **Defensa:** Diversos grupos de defensa han reconocido el peso desproporcionado del cáncer en las comunidades negra e hispana del Condado de Mercer. A nivel del condado se han planificado programas para la toma de conciencia, la educación y la detección precoz.

Condado de Mercer y Nueva Jersey

Tasa de incidencia anual promedio ajustada por la edad y tasa de mortalidad por sitio 1996-2000 versus 2000-2004

| Todos los tipos de cáncer | Tasa de incidencia cada 100,000* | | | | Tasa de mortalidad cada 100,000** | | | |
|---|----------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| | Condado de Mercer | | | NJ | Condado de Mercer | | | NJ |
| | 1996-2000 ¹ | 2000-2004 ² | Variación (%) | 2000-2004 ² | 1996-2000 ³ | 2000-2004 ² | Variación (%) | 2000-2004 ² |
| Hombres | 636.6 | 626.1 | -1.6 | 614.4 | 266.1 | 225.8 | -15.1 | 236.8 |
| Mujeres | 452.4 | 457.1 | 1.0 | 447.0 | 180.9 | 166.9 | -7.7 | 171.9 |
| Cánceres prioritarios según el CCCP de NJ, por sexo | | | | | | | | |
| De mama, mujeres | 140.4 | 136.8 | -2.6 | 131.9 | 33.1 | 28.7 | -13.3 | 28.5 |
| De cuello uterino, mujeres | 9.7 | 10.2 | 5.2 | 9.6 | 3.1 | 2.7 | -12.9 | 2.7 |
| Colorrectal, hombres | 78.4 | 67.7 | -13.6 | 70.2 | 32.3 | 21.0 | -35.0 | 25.9 |
| Colorrectal, mujeres | 52.9 | 50.1 | -5.3 | 50.8 | 20.6 | 18.6 | -9.7 | 18.3 |
| De pulmón, hombres | 93.0 | 86.4 | -7.1 | 82.4 | 73.3 | 62.3 | -15.0 | 66.5 |
| De pulmón, mujeres | 52.6 | 52.8 | 0.4 | 55.4 | 37.2 | 36.9 | -0.8 | 40.7 |
| Melanoma, hombres | 19.8 | 26.3 | 32.8 | 24.4 | 2.9 | 3.3 | 13.8 | 3.9 |
| Melanoma, mujeres | 10.5 | 16.0 | 52.4 | 15.0 | 1.3 | 1.7 | 30.8 | 1.7 |
| Oral/orofaríngeo, hombres | 20.5 | 16.2 | -21.0 | 14.6 | 4.5 | 3.2 | -28.9 | 3.8 |
| Oral/orofaríngeo, mujeres | 7.7 | 7.3 | -5.2 | 6.0 | 1.7 | 1.9 | 11.8 | 1.4 |
| De próstata, hombres | 201.7 | 201.7 | 0.0 | 192.7 | 36.5 | 28.0 | -23.3 | 27.0 |

Fuentes:

- 1 Registro del Cáncer del Estado de Nueva Jersey, Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores de Nueva Jersey, Agosto de 2003.
- 2 Registro del Cáncer del Estado de Nueva Jersey, Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores de Nueva Jersey. *Tasas de cáncer. Info/NJ.* <http://www.nj.gov/health/ces/cancer-rates.shtml> (Noviembre de 2007).
- 3 Instituto Nacional del Cáncer y Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, State Cancer Profiles (Perfil del cáncer por estado) (En <http://statecancerprofiles.cancer.gov/>).

Notas:

Las tasas están ajustadas por edad a los estándares de población del Censo Estadounidense del 2000.

Las tasas que superan en al menos un 10% la tasa estatal correspondiente se muestran en letra **negrita cursiva**.

Las tasas anuales para cánceres relativamente no comunes tienden a fluctuar notablemente de un año a otro debido al pequeño número de casos. El % de variación para los cánceres cuyas tasas de incidencia y/o mortalidad son bajas debe interpretarse con cautela.

* Cantidad de nuevos casos diagnosticados en una población determinada durante un tiempo determinado cada 100,000 personas.

** Cantidad de muertes a causa de una enfermedad en una población determinada durante un tiempo determinado cada 100,000 personas.



Para obtener más información:

New Jersey Department of Health & Senior Services
Office of Cancer Control and Prevention
P.O. Box 360
Trenton, NJ 08611-2425
(609) 984-4978
www.njcancer.gov

