

Niektóre z zachowań, które powinno przejawiać dziecko z normalnym słuchem:

W wieku od urodzenia do 3 miesięcy

- Mruganie lub podskakiwanie, jeżeli usłyszy nagły, głośny dźwięk
- Uspokajanie się lub uśmiechanie, kiedy się do niego mówi
- Wydawanie takich dźwięków jak "oo" lub "aa"

W wieku od 3 do 6 miesięcy

- Szukanie wzrokiem dźwięków
- Gaworzenie ("baba", "mama", "gaga")
- Używanie wielu dźwięków, pieszczanie, chichotanie

W wieku od 6 do 9 miesięcy

- Odwracanie głowy w kierunku głośnych dźwięków
- Rozumienie "nie, nie" lub "pa, pa"
- Gaworzenie, na przykład "baba", "mama", "gaga"

W wieku od 9 do 12 miesięcy

- Powtarzanie prostych słów i dźwięków przez siebie wydawanych
- Poprawne używanie "mama" lub "tata"
- Reagowanie na śpiewanie lub muzykę
- Wskazywanie na ulubione zabawki lub obiekty, jeżeli jest o nie pytane

Jeżeli masz pytania dotyczące słuchu twojego dziecka lub powyższej listy, porozmawiaj ze swoim przedstawicielem służby zdrowia.

Gdzie jeszcze mogę zdobyć informacje?

New Jersey Department of Health
Early Hearing Detection and Intervention Program
PO Box 364 • Trenton, NJ 08625-0364
(609) 984-1343 (tel. dla g?uchoniemych)
(609) 292-5676 (tylko g?osowy)
ehdi@doh.state.nj.us
www.nj.gov/health/fhs/ehdi/
www.hearinghelp4kids.nj.gov



Czy twoje dziecko słyszy?

Pierwsze badanie słuchu twojego dziecka

(Can Your Baby Hear? - Polish)



Chris Christie, Governor
Kim Guadagno, Lt. Governor

Mary E. O'Dowd, MPH
Commissioner

Dlaczego słuch mojego dziecka powinien być zbadany?

- Większość dzieci dobrze słyszy po urodzeniu, niektóre jednak nie.
- Badamy dzieci, by znaleźć te, które mogą mieć kłopoty ze słuchem.
- Badanie jest jedynym sposobem by stwierdzić, czy dziecko ma wadę słuchu.
- Ważne jest, by wykryć utratę słuchu jak najszybciej. Dzieci, których utrata słuchu nie jest wcześniej wykryta, będą miały kłopoty z nauką.
- Jeżeli wykryjemy wcześniej utratę słuchu, będziemy mogli pomóc twojemu dziecku na wiele sposobów.

Upewnij się, że badanie słuchu twojego dziecka jest przeprowadzone przed twoim wyjściem ze szpitala.

Co powinnam wiedzieć o badaniu słuchu?

- Badanie jest bezpieczne i bezbolesne, oraz może być przeprowadzone w ciągu 10 minut.
- Większość dzieci śpi w trakcie badania.
- Otrzymasz wyniki badania przed swoim wyjściem ze szpitala.
- Nie zapomnij podać w szpitalu nazwisko swojego lekarza lub nazwę swojej przychodni, by szpital mógł przelać im wyniki badania.



Dlaczego niektóre dzieci potrzebują dodatkowego badania słuchu?

- Niektóre dzieci mogą potrzebować dodatkowego badania ze względu na:
 - *płyn w uchu*
 - *hałas w pokoju, w którym prowadzono badanie*
 - *dużą ruchliwość dziecka w czasie badania*
 - *utratę słuchu przez dziecko*
- Większość dzieci wymagających dodatkowego badania ma słuch w normie. Niektóre z nich mają utratę słuchu.
- Jeżeli badanie słuchu twojego dziecka da wynik negatywny, dopilnuj, by zostało ono jak najszybciej ponownie przebadane.

Czy nowo urodzone dziecko może pozytywnie przejść badania słuchu, a jednak mieć utratę słuchu?

- Tak, niektóre dzieci słyszą na tyle dobrze, by pozytywnie przejść pierwsze badanie, później jednak tracą słuch z powodu:
 - *pewnych chorób* • *pewnych leków*
 - *pewnych obrażeń* • *rodzinnych skłonności do utraty słuchu*
- Bądź wyczulona na znaki utraty słuchu w miarę tego jak rośnie twoje dziecko.
- Korzystaj z listy podanej na tylnej okładce jako przewodnika.