



# 보육시설 및 유치원을 위한 뉴저지 학교 예방접종 요건

뉴저지는 어린이집과 유치원에 다니는 아이들이 **최소 예방접종요건을 충족하도록 요구합니다.** 이 백신들은 어린 아이들이 서로 밀접하게 접촉하는 집단 환경에서 쉽게 퍼질 수 있는 심각한 질병으로부터 아이들을 보호하는 데 도움을 줍니다. 최상의 보호를 위해 아동은 [AAP 소아 청소년 예방접종 일정을 따라야 합니다.](#)

아래 정보는 입학 시 아동의 나이에 따라 필요한 백신 접종 횟수를 보여줍니다. 아이가 일정에 뒤처진 경우, 기재된 용량보다 적은 용량이 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 자녀의 의료 제공자와 상담하세요.

두 번째 페이지의 주석은 추가 정보와 자료를 제공합니다.

**3개월 차**

**투여 횟수**

DtaP 1회  
IPV/OPV 1회  
Hib 1회  
PCV 1회

**5개월 차**

**투여 횟수**

DtaP 2회  
IPV/OPV 2회  
Hib 2회  
PCV 2회

**7개월 차**

**투여 횟수**

DtaP 3회  
IPV/OPV 2회  
Hib 2~3회  
PCV 3회  
독감 1회\*

**\*6개월 이상 어린이를 대상으로 매년 11월 30일까지 독감 백신 접종이 예정되어 있습니다.**

각 연령별로 기재된 백신 수는 해당 연령별로 필요한 총 접종 용량을 나타내며, 추가 백신 수량은 아닙니다. 예를 들어, 7개월 유아는 3회 DTaP 접종이 필요하며, 19개월 차에는 총 4회가 필요합니다.

**16개월 차**

**투여 횟수**

DtaP 3회  
IPV/OPV 2회  
Hib 3~4회  
PCV 4회  
독감 1회  
MMR 1회  
VAR 1회

**19개월 차**

**투여 횟수**

DtaP 4회  
IPV 3회  
Hib 3~4회  
PCV 4회  
독감 1회  
MMR 1회  
VAR 1회

**백신 키**

**DTaP:** 디프테리아, 파상풍, 그리고 백일해  
**Hib:** 인플루엔자b형  
**독감:** 인플루엔자  
**IPV/OPV:** 불활성화 소아마비 백신/경구 소아마비 백신  
**MMR:** 홍역, 유행성 이하선염, 풍진  
**PCV:** 폐렴구균 결합 백신  
**VAR:** 수두

# 보육시설 및 유치원을 위한 뉴저지 학교 예방접종 요건



이 문서는 요약본입니다. 뉴저지의 최소 예방접종 요건은 미국 소아과학회(AAP)의 [소아 청소년 예방접종 일정을 기준으로 합니다](#).

**보육/유치원 입학 전:** 모든 아동은 각 필수 백신을 최소 한 차례 접종했다는 증명서를 제시해야 합니다. 이를 임시 입학이라고 합니다. 학교에 등재되지 않은 시기에 입학하는 아동은 이전 연령대의 백신을 맞아야 합니다. 예를 들어, 생후 2개월된 아기가 보육 및 유치원 시설에 다니려면 생후 3개월 된 아기와 같은 수의 접종을 받아야 합니다.

**등원 시:** 모든 아이들은 1페이지에 명시된 기간까지 백신을 맞아야 합니다. AAP 예방접종 일정은 특정 백신의 연령 범위를 제공합니다. 예를 들어:

- DTaP는 15개월에서 18개월에 사이에 권장됩니다.
- IPV(소아마비)는 6개월에서 18개월까지 권장됩니다.
- MMR과 수두 접종은 12개월에서 15개월에 권장됩니다.

이 권고사항이 권장 범위로 제공되기 때문에, 아동은 그 기간 내 어느 시점에든 백신을 맞을 수 있습니다. 일부 아동은 건강 진료 일정에 따라 권장 범위보다 더 일찍 투여받기도 합니다. 뉴저지의 보육 및 유치원 요건은 가족들이 권장 기간 내에 접종을 완료할 수 있도록 구조화되어 있습니다. 예를 들어, 아이는 생후 6개월차에 세 차례 IPV 접종을 받을 수 있습니다. 하지만 세 번째 IPV 접종 권장 범위가 6~18개월이기 때문에, 뉴저지는 전체 기간이 만료되는 19개월 전까지 세 번째 접종 기록을 요구하지 않아 가족들이 권장 기간 전체를 충족할 수 있도록 합니다.

필수 백신을 맞지 않은 아동은 후속 예방접종 일정을 따라야 하며, 부모는 자녀가 회복 과정을 따라잡을 수 있도록 의료 제공자와 상담해야 합니다. 아이가 일정에 뒤처진 경우, 기재된 용량보다 적은 용량이 필요할 수 있습니다.

의료 및 종교적 면제(백신 접종 거부 사유)는 보육원 및 학교 아동 예방접종 규정에 자세히 명시되어 있습니다. 규정 열람 방법은 [nj.gov/health/cd/imm\\_requirements/acode](http://nj.gov/health/cd/imm_requirements/acode) 에서 확인할 수 있습니다. 또 다른 자료는 [nj.gov/health/cd/imm\\_requirements](http://nj.gov/health/cd/imm_requirements) 에서 확인할 수 있는 "NJ 예방접종 요건 자주 묻는 질문"입니다.

**IPV/OPV:** OPV는 권장되지 않으며 미국에서는 구할 수 없습니다. 하지만 OPV는 다른 국가에서 사용될 수 있습니다. 2016년 4월 이전에 접종된 경우에만 접종이 허용됩니다. 2016년 4월 이후 OPV 백신을 접종받은 어린이는 대신 IPV 백신을 맞아야 합니다. IPV/OPV의 세 번째 접종은 빠르면 생후 6개월부터 투여할 수 있으나, 19개월이 전까지는 필수입니다.

**Hib:** 6개월이 되면 어린이는 최소 2회 접종이 필요하지만, 접종받은 백신 브랜드에 따라 일부 어린이는 6개월까지 3회 접종을 해야 합니다.

**Hib/PCV:** 백신 접종 시기와 종류에 따라 적은 접종 용량이 허용될 수 있습니다. 권장/따라잡은 일정을 참고하세요. 모든 경우에 한 번 이상의 접종은 첫 번째 생일 당일 또는 그 이후에 투여되어야 합니다.

**독감:** 어린이집이나 유치원에 등록된 6개월 이상 모든 어린이에게 매년 11월 30일까지 독감 백신 접종이 필요합니다.

**MMR:** 어린이는 생후 12개월부터 접종할 수 있지만, 보육/유치원에 출석하는 아동은 16개월까지 맞아야 합니다.

**수두:** 어린이는 생후 12개월부터 접종할 수 있지만, 보육/유치원에 출석하는 아동은 16개월까지 맞아야 합니다.