



新泽西州托儿所和学前班疫苗接种要求

新泽西州要求就读托儿所和学前班的儿童必须满足**最低免疫接种要求**。这类疫苗可保护儿童免受在集体环境中易传播的严重疾病侵害——幼儿在此类场所会与他人密切接触。为获得最佳防护效果，儿童应遵循[美国儿科学会 \(American Academy of Pediatrics, AAP\) 儿童疫苗接种计划](#)完成接种。

下文信息根据儿童入园时的年龄，列出了所需的疫苗剂次。若儿童的接种进度滞后，实际所需剂次可能少于表中所列数量。具体情况请咨询孩子的医疗保健提供者。

第二页的注释将提供补充信息与相关资源。

3 月龄前

所需剂次

- 1 剂 DTaP
- 1 剂 IPV/OPV
- 1 剂 Hib
- 1 剂 PCV

5 月龄前

所需剂次

- 2 剂 DTaP
- 2 剂 IPV/OPV
- 2 剂 Hib
- 2 剂 PCV

7 月龄前

所需剂次

- 3 剂 DTaP
- 2 剂 IPV/OPV
- 2-3 剂 Hib
- 3 剂 PCV
- 1 剂 Flu*

***所有 6 月龄及以上的儿童需在每年 11 月 30 日前完成流感疫苗接种。**

每个年龄段列出的疫苗剂次数代表该年龄段需完成的总剂次数，而非额外追加剂次。例如，到 7 月龄时需完成 3 剂 DTaP 疫苗接种，到 19 月龄时需累计完成 4 剂 DTaP 疫苗接种。

16 月龄前

所需剂次

- 3 剂 DTaP
- 2 剂 IPV/OPV
- 3-4 剂 Hib
- 4 剂 PCV
- 1 剂 Flu*
- 1 剂 MMR
- 1 剂 VAR

19 月龄前

所需剂次

- 4 剂 DTaP
- 3 剂 IPV
- 3-4 剂 Hib
- 4 剂 PCV
- 1 剂 Flu*
- 1 剂 MMR
- 1 剂 VAR

疫苗缩写

- DTaP:** 白喉、破伤风、百日咳联合疫苗
- Hib:** b 型流感嗜血杆菌疫苗
- Flu:** 流感疫苗
- IPV/OPV:** 脊髓灰质炎灭活疫苗/口服脊髓灰质炎疫苗
- MMR:** 麻疹、腮腺炎、风疹联合疫苗
- PCV:** 肺炎球菌结合疫苗
- VAR:** 水痘疫苗

新泽西州托儿所和学前班疫苗接种要求



这是一份摘要文件。新泽西州的最低免疫接种要求以美国儿科学会 (AAP) 的[儿童疫苗接种计划](#)为依据制定。

托儿所/学前班入园前规定：所有儿童在进入托儿所/学前班前，需出示每一种必需疫苗至少 1 剂的接种证明，此为临时入园资格。若儿童的入园时间未在上表中所列年龄范围内，则需按上一个年龄组的剂次要求完成接种。例如，2 月龄儿童入托，需达到 3 月龄儿童的剂次标准，方可入园。

在园期间要求：所有儿童需在文件首页所列的时间节点前完成对应剂次的疫苗接种。AAP 免疫接种计划对部分疫苗给出了推荐接种年龄范围。例如：

- DTaP：推荐 15–18 月龄接种。
- IPV：推荐 6–18 月龄接种。
- MMR 与水痘疫苗：推荐 12–15 月龄接种。

由于这些推荐接种时间以区间形式给出，儿童可在该窗口期内的任意时间接种疫苗。部分儿童会根据健康体检安排，在推荐区间的早期完成接种。新泽西州的托儿所和学前班接种要求充分考虑了推荐的完整接种窗口期，为家庭提供充足时间完成接种。例如，儿童最早可在 6 月龄完成 3 剂 IPV 接种，但由于第 3 剂 IPV 的推荐窗口期为 6-18 月龄，新泽西州不会要求在窗口期结束前（即 19 月龄前）提供该剂次的接种证明，让家庭能在完整的推荐周期内满足要求。

未按要求完成接种的儿童，需遵循补种免疫计划完成接种；家长应咨询孩子的医疗保健提供者，协助孩子完成补种。若儿童的接种进度滞后，实际所需剂次可能少于表中所示数量。

医疗豁免与宗教豁免（未接种疫苗的原因）详见《托儿所和学前班儿童免疫接种条例》(Immunization of Children in Child Care Centers and Schools regulations)。条例查阅指引可访问：nj.gov/health/cd/imm_requirements/acode。另一参考资料为《新泽西州免疫接种要求常见问题解答》(NJ Immunization Requirements Frequently Asked Questions)，可访问：nj.gov/health/cd/imm_requirements 获取。

IPV/OPV：OPV 在美国不推荐使用，也无供应。其他国家可能使用 OPV，仅 2016 年 4 月前接种的 OPV 剂次可被认可。2016 年 4 月后接种 OPV 的儿童，需改用 IPV 完成后续接种。第 3 剂 IPV/OPV 最早可在 6 月龄接种，但必须在 19 月龄前完成。

Hib：儿童 6 月龄前需至少完成 2 剂 Hib 接种；部分儿童根据所用疫苗品牌的不同，6 月龄前可能已完成 3 剂接种。

Hib/PCV：根据接种时间与疫苗类型，实际所需剂次可能少于表中所示数量，需参照推荐接种/补种程序。所有情况下，至少 1 剂需在满 1 周岁及之后接种。

Flu：所有 6 月龄及以上、就读托儿所或学前班的儿童，需在每年 11 月 30 日前完成 1 剂流感疫苗接种。

MMR：儿童最早可在 12 月龄接种该疫苗，但必须在 16 月龄前完成，方可就读托儿所/学前班。

水痘疫苗：儿童最早可在 12 月龄接种该疫苗，但必须在 16 月龄前完成，方可就读托儿所/学前班。