

متطلبات لقاحات المدارس في نيوجيرسي (K-12)

تلتزم ولاية نيوجيرسي الأطفال الذين يرتادون المدرسة باستيفاء الحد الأدنى من متطلبات اللقاح. تساعد هذه اللقاحات في حماية الأطفال من الأمراض الخطيرة التي يمكن أن تنتشر بسهولة في أماكن التجمعات، حيث يتواجدون في اتصال مباشر مع بعضهم البعض. لضمان أفضل حماية، ينبغي للأطفال اتباع [جدول لقاحات الأطفال الخاص بالأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال \(AAP, American Academy of Pediatrics\)](#).



يوضح الجدول أدناه عدد جرعات اللقاح المطلوبة بناءً على السنة الدراسية التي يلتحق بها الطفل. قد يحتاج الطفل إلى عدد جرعات أقل مما هو مدرج في القائمة إذا كان متأخرًا عن الجدول الزمني. لذا يرجى التحدث مع طبيب طفلك للحصول على التفاصيل.

الصفوف 12-7	الصفوف 6-2	الروضة/الصف 1 (سنة الالتحاق)	
إثبات إتمام السلسلة الأساسية بالإضافة إلى 1 جرعة على الأقل من Tdap عند سن 10 سنوات أو أكبر.	إثبات إتمام السلسلة الأساسية (1 جرعة على الأقل عند إتمام سن 4 سنوات أو بعدها)	السلسلة الأساسية: 4 أو 5 جرعات (1 جرعة على الأقل عند إتمام سن 4 سنوات أو بعدها)	DTaP (للأطفال دون سن 7 سنوات) Td/Tdap (للأطفال من عمر 7 سنوات فما فوق)
إجمالي 3 أو 4 جرعات (1 جرعة على الأقل عند إتمام سن 4 سنوات أو بعدها)			IPV/OPV
إجمالي 2 جرعة			MMR
إجمالي 1 جرعة			VAR
إجمالي 3 جرعات (أو سلسلة معتمدة من 2 جرعة)			Hep B
إجمالي 1 جرعة يجب إعطاؤها عند سن 10 سنوات أو أكبر	لا يوجد	لا يوجد	Men ACWY

دليل اختصارات التطعيمات

MMR: لقاح الحصبة والنكاف والحمى

DTaP: لقاح الدفتيريا والكزاز والشاهوق (السعال الديكي)

VAR: لقاح الجدري المائي

Td: لقاح الكزاز والدفتيريا

Hep B: لقاح التهاب الكبد ب

Tdap: لقاح الكزاز والدفتيريا والشاهوق

MenACWY: لقاح التهاب السحايا

IPV/OPV: لقاح شلل الأطفال بالحقن ولقاح شلل الأطفال بالفم

هذه وثيقة ملخصة. يستند الحد الأدنى من متطلبات اللقاح في ولاية نيوجيرسي إلى جدول لقاحات الأطفال الخاص بالأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP)، [جدول لقاحات الأطفال الخاص بـ AAP](#). يطلب الحصول على اللقاحات في أقرب عمر للالتحاق بالمدرسة. يتعين على الأطفال غير المستوفين للتطعيمات المطلوبة اتباع جدول اللقاحات الاستدراكي؛ ويجب على الآباء التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم لمساعدة أطفالهم على استدراك ما فاتهم.

تفصل الاستثناءات الطبية والدينية (أسباب عدم تلقي اللقاحات) في لوائح لقاح الأطفال في مراكز رعاية الأطفال والمدارس. تتوفر تعليمات الاطلاع على هذه اللوائح عبر الرابط nj.gov/health/cd/imm_requirements/acode/. كما يوجد مورد آخر وهو "NJ Immunization Requirements Frequently Asked Questions" (الأسئلة الشائعة حول متطلبات اللقاح في نيوجيرسي) والمتاح على الرابط nj.gov/health/cd/imm_requirements/.

DTaP/Td/Tdap*

الروضة أو الصف 1: عند بدء الأطفال الدراسة، يجب أن يكونوا قد تلقوا 4 أو 5 جرعات من لقاح DTaP، ويعتمد ذلك على سنهم عند بدء سلسلة اللقاح. ويجب إعطاء 1 جرعة على الأقل عند إتمام سن 4 سنوات أو بعدها.

الصفوف 2-6: تعني السلسلة الأساسية إكمال جميع الجرعات الأولية للقاح. ويجب على الأطفال في سن 7 سنوات فأكثر، الذين لم يستوفوا اللقاحات المقررة، إما إكمال سلسلة لقاحات Td/Tdap، بشرط تلقي 1 جرعة منها عند إتمام سن 4 سنوات أو بعدها. أو تقديم ما يثبت تلقيهم 3 جرعات إجمالية على الأقل من أي من هذه اللقاحات DTaP أو Td أو Tdap. يمكن لمقدم الرعاية الصحية الخاص بك مساعدة طفلك على استدراك ما فاتته باستخدام جدول الاستدراك.

الصفوف 7 فأعلى: يجب أن يحصل الطلاب على 1 جرعة من لقاح Tdap عند سن 10 سنوات أو أكبر، وتقديم ما يثبت إكمالهم السلسلة الأساسية.

من الروضة حتى الصف 12

IPV/OPV: لا يوصى باستخدام OPV، كما أنه غير متوفر في الولايات المتحدة. ومع ذلك، قد يستخدم OPV في دول أخرى. لا تقبل الجرعات إلا إذا أعطيت قبل أبريل 2016. يجب على الأطفال الذين يتلقون جرعات OPV بعد أبريل 2016 تلقي جرعات IPV بدلاً منها. ويجب إعطاء 1 جرعة على الأقل عند إتمام سن 4 سنوات أو بعدها. يرجى ملاحظة أن جرعات لقاح شلل الأطفال لم تكن مطلوبة سابقاً لمن بلغوا سن 18 سنة أو أكبر؛ ومع ذلك، يجب على من بلغوا 18 سنة أو أكبر الآن استيفاء متطلبات الحضور المدرسي.

MMR: 2 جرعة من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة.

لقاح الجدري المائي: يلزم الحصول على 1 جرعة من لقاح الجدري المائي. توصي AAP بـ 2 جرعة، ولكن استيفاؤهما ليس شرطاً للالتحاق بالمدرسة.

Hep B: 3 جرعات أو سلسلة معتمدة من 2 جرعة.

تطعيم التهاب السحايا: يلزم الحصول على 1 جرعة من لقاح التهاب السحايا لمن تبلغ أعمارهم 10 سنوات فأكثر في الصف 7 فأعلى. ويلزم تكرار جرعات لقاح التهاب السحايا التي أعطيت قبل سن 10 سنوات.