

INFORMACIÓN DE ALTA PARA PACIENTES QUE REGRESAN A CASA CON UN GERMEN EMERGENTE RESISTENTE A LOS ANTIBIÓTICOS

Muchos medicamentos antibióticos no funcionan cuando alguien está enfermo con un germen resistente a los antibióticos. Los pacientes pueden tener estos gérmenes y no mostrar síntomas o signos de enfermedad, lo que se llama colonización. Los pacientes colonizados pueden propagar los gérmenes a otros pacientes y al entorno de atención. Actualmente no hay tratamiento efectivo para la colonización con gérmenes emergentes resistentes a los antibióticos y no se recomienda volver a evaluar a los pacientes.

Los gérmenes resistentes a los antibióticos tienen más probabilidades de afectar (colonizar o infectar) a los pacientes que requieren atención médica frecuente en hospitales y hogares de ancianos. Estos pacientes a menudo tienen muchos factores de riesgo, como sistemas inmunológicos debilitados, uso de antibióticos o tener dispositivos médicos como tubos o catéteres que entran en su cuerpo. Los familiares y miembros del hogar que están sanos tienen una baja probabilidad de contraer gérmenes resistentes a los antibióticos.

ATENCIÓN EN EL HOGAR

- Las infecciones pueden prevenirse o controlarse mediante una higiene personal adecuada al lavar regularmente el cuerpo y el cabello con jabón/champú y agua.
- Las personas que cuidan a los pacientes con gérmenes resistentes a los antibióticos deben lavarse las manos o usar desinfectante de manos a base de alcohol antes y después de brindar atención o tocar dispositivos médicos.
- La higiene de manos (incluidos el lavado de manos con jabón y agua y el uso de desinfectante de manos) es particularmente importante para prevenir la propagación de estos gérmenes a otros si el cuidador del hogar asiste a múltiples miembros del hogar con atención de rutina en el hogar.
- Las personas que cuidan a los pacientes con gérmenes resistentes a los antibióticos también deben considerar usar guantes desechables cuando tengan contacto con las heridas o fluidos corporales de un paciente, como sangre, heces, orina y vómito; siempre deben realizar la higiene de manos antes y después de usar guantes.

Informe a sus proveedores de atención médica, incluidos los trabajadores o asistentes de atención médica a domicilio, que usted tiene un germen resistente a los antibióticos. Pueden tomar medidas para prevenir su propagación limpiándose las manos y usando una bata y guantes según sea necesario. También tendrán que limpiar y desinfectar cualquier equipo reutilizable que se utilizó durante la atención.

¿QUÉ DEBE HACER CUANDO RECIBE ATENCIÓN MÉDICA EN UN HOSPITAL, CENTRO DE DIÁLISIS U OTRO CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA?

Es importante llevar esta información con su documentación médica. **Por favor, muestre esta información a su equipo de atención médica cada vez que reciba atención médica** en un departamento de emergencias, hospital, centro de diálisis, hogar de ancianos u otro centro de atención médica. **Es importante que los centros de atención médica y los proveedores sepan quién tiene estos gérmenes y tomen medidas para prevenir la propagación de gérmenes a otros pacientes.**

INFORMACIÓN PARA SU PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA

ALERTA MÉDICA: ORGANISMO PRODUCTOR DE CARBAPENEMASAS

Nombre del Paciente: _____

Fecha de Nacimiento: _____

Estimado Trabajador de Atención Médica,

Los organismos productores de carbapenemasas (CPO) son bacterias resistentes que pueden causar infecciones graves entre pacientes vulnerables, incluidos los pacientes que requieren hospitalización o atención a largo plazo. Los CPO pueden propagarse fácilmente dentro de los entornos de atención médica a través del contacto directo o indirecto con dispositivos y equipos médicos contaminados, superficies ambientales contaminadas o personas colonizadas o infectadas con CPO. Actualmente no hay tratamiento efectivo para la colonización de CPO y no se recomienda volver a evaluar a los portadores para confirmar la eliminación.

Al cuidar a un paciente colonizado y/o infectado con un CPO:

- Coloque al paciente en Precauciones de Contacto y en una habitación privada (si está disponible).
- Limpie y desinfecte minuciosamente la habitación del paciente y el equipo/dispositivos médicos con desinfectantes registrados por la EPA.
- Use tanto equipo y dispositivos exclusivos/asignados y/o desechables como sea posible.
- Use desinfectante de manos a base de alcohol o jabón y agua para lavarse las manos en todos los momentos clave para la higiene de manos.
- Marque el registro médico del paciente para indicar su estado positivo de CPO y la necesidad continua de Precauciones de Contacto durante todas las visitas y admisiones futuras.
- Asegúrese de que cualquier centro de atención médica al que se transfiera al paciente reciba una notificación verbal y por escrito sobre su estado positivo de CPO. La Hoja de cobertura de transferencia para MDRO emergentes del Departamento de Salud de New Jersey (NJDOH) (a la que se puede acceder a través del código QR a continuación) puede utilizarse para comunicar al centro receptor el estado positivo de CPO del paciente.



ESCANÉAME

Póngase en contacto con su Departamento de Prevención y Control de Infecciones (IPC) para obtener más información. Si el Departamento de IPC necesita orientación adicional, debe ponerse en contacto con NJDOH en DOH.CDS.HAIAR.EPI@doh.nj.gov y notificar a su departamento de salud local, que se puede encontrar en www.nj.gov/health/lh/community/.