Pessoas com quem você mora ou com quem tem contato próximo devem fazer o teste. Se não tiverem hepatite B, a vacinação pode protegê-las.

O esquema de vacinação contra a hepatite B é recomendado para:

- Todas as crianças, do nascimento aos 18 anos
- Adultos de 19 a 59 anos
- Adultos com 60 anos ou mais que apresentem maior risco ou desejem proteção

A maioria dos planos de saúde cobre as vacinas recomendadas. Verifique com seu plano de saúde ou profissional de saúde. Algumas pessoas podem ser elegíveis para vacinas gratuitas ou de baixo custo por meio do programa Vaccines for Children (Vacinas para Crianças) ou do programa para adultos financiado pela seção 317. Para mais informações, escaneie o código QR da ferramenta de busca de profissionais VFC/317.

Para mais informações

Departamento de Saúde de Nova Jersey (New Jersey Department of Health)
nj.gov/health/vaccines
bit.ly/4drSuKb

Departamento de Saúde Local (Local Health Department)
localhealth.nj.gov

Centro de Saúde Qualificado Federalmente (Federally Qualified Health Center)
bit.ly/4tcesW9

Fundação de Hepatite B (Hepatitis B Foundation)
hepb.org

Ferramenta de busca de profissionais VFC/317 (VFC/317 Provider Search Tool)
bit.ly/4ncUoSh

Siga-nos nas redes sociais @NJDeptofHealth:
Facebook, Instagram, Threads, X, LinkedIn e YouTube

New Jersey Department of Health
Communicable Disease Service
Vaccine Preventable Disease Program
PO Box 369
Trenton, NJ
609-826-4861

Vivendo com hepatite B



Para adolescentes ou jovens adultos

NJHealth
New Jersey Department of Health



O que é a hepatite B (HBV)?

- O HBV é um vírus que afeta o fígado. Pode ser uma doença de curta ou longa duração. Muitas vezes, não há sintomas. Se houver sintomas, você pode sentir cansaço, mal-estar ou apresentar amarelamento da pele ou dos olhos.
- A maioria das pessoas se recupera, mas algumas desenvolvem uma infecção crônica que pode danificar o fígado ou causar câncer.

VOCÊ PODE LEVAR UMA VIDA NORMAL COM O HBV, INCLUSIVE ENGRAVIDAR E DAR À LUZ.

Converse com seu médico sobre como evitar a transmissão para o seu bebê.

Como ela é transmitida?

O HBV se espalha pelo sangue e por meio de fluidos corporais infectados. Isso inclui:

- ter relações sexuais sem proteção
- compartilhar itens pessoais (por exemplo: lâminas de barbear, escovas de dente, glicosímetros)

Uma pessoa infectada pode transmitir o vírus para o bebê durante o parto.

Ele não é transmitido por alimentos, água, tosse, espirro ou contato casual, como abraços ou beijos.

Como posso evitar transmitir a doença a outras pessoas?

- Os membros da família e os parceiros sexuais devem fazer o teste para o HBV. Se não tiverem o vírus, devem se vacinar para se protegerem contra a infecção pelo HBV.
- Se tiver um corte ou ferida aberta, cubra-o para evitar que o sangue infecte outras pessoas.
- Tenha relações sexuais usando preservativo ou outra barreira de látex para proteção.
- Não compartilhe itens de uso pessoal.
- Se você acha que expôs alguém ao vírus (por exemplo, por meio de uma picada de agulha ou contato com sangue), procure atendimento médico imediatamente.

