

A vacina contra a hepatite B é segura?

A vacina contra a hepatite B é muito segura. O efeito colateral mais comum é dor no local da injeção ou leve febre. Efeitos colaterais graves são raros.

Comece a proteger seu bebê desde o nascimento com a primeira dose da vacina contra a hepatite B.



Onde posso obter mais informações?

- Seu profissional de saúde
- Programa de Doenças Preveníveis por Vacinação do Departamento de Saúde de Nova Jersey (New Jersey Department of Health Vaccine Preventable Disease Program)
  609-826-4861
  nj.gov/health/cd/vpdp.shtml
- Academia Americana de Pediatria (American Academy of Pediatrics, AAP)
  Primeira dose da vacina contra a hepatite B ao nascer
- Coalizão de Ação pela Imunização (Immunization Action Coalition, IAC)
  immunize.org/protect-newborns

Consulte seu profissional de saúde para obter orientações sobre suas necessidades específicas. Este folheto não substitui a orientação médica.

Agradecemos especialmente ao Departamento de Saúde do Estado de Washington (Washington State Department of Health) pela autorização para modificar este folheto.

NJHealth New Jersey Department of Health

C55082

Comece a proteger seu bebê desde o nascimento com a vacina contra a hepatite B



NJHealth New Jersey Department of Health

O que é a hepatite B?

A hepatite B é causada por um vírus que ataca o fígado. Ela pode causar doenças graves, câncer de fígado e, em alguns casos, a morte.

Muitas pessoas que contraem hepatite B não parecem nem se sentem doentes. Outras pessoas podem apresentar perda de apetite, dor de estômago, cansaço extremo ou amarelamento da pele ou dos olhos.

Como a hepatite B é transmitida?

A hepatite B é transmitida quando sangue, sêmen ou outros fluidos corporais que contêm o vírus da hepatite B entram no organismo de uma pessoa suscetível à infecção. As pessoas podem contrair o vírus das seguintes formas:

- Parto (transmissão de uma pessoa grávida infectada para o bebê durante o parto)
- Relações sexuais com um parceiro infectado
- Compartilhamento de objetos como lâminas de barbear, escovas de dentes, cortadores de unhas, agulhas e seringas e medidores de glicose com uma pessoa infectada
- Contato direto com o sangue ou feridas abertas de uma pessoa infectada
- Exposição ao sangue por picadas acidentais de agulhas ou outros instrumentos perfurocortantes

O vírus da hepatite B **NÃO** é transmitido pelo compartilhamento de utensílios para comer, pela amamentação, por abraços, beijos, contato entre as mãos, tosse ou espirros.



Por que as pessoas grávidas devem ser vacinadas contra a hepatite B?

Pessoas grávidas com hepatite B podem transmitir a doença aos seus recém-nascidos. Os bebês têm mais dificuldade para combater a infecção por hepatite B do que crianças mais velhas ou adultos. Os bebês infectados ao nascer têm 90% de chance de desenvolver hepatite B crônica, a forma mais grave da doença.

A hepatite B crônica pode, com o tempo, causar problemas graves de saúde, incluindo danos ao fígado, câncer de fígado e até mesmo a morte.

Como um bebê pode entrar em contato com o vírus da hepatite B?

Em muitos casos, as pessoas grávidas transmitem o vírus da hepatite B durante o parto porque não sabem que estão infectadas. Em outros casos, o vírus é transmitido ao bebê por um familiar, cuidador ou amigo infectado. A maioria das pessoas infectadas com hepatite B não se sente doente e nem sabe que carrega esse vírus.

Você e seu bebê correm maior risco de contrair hepatite B se você, seus pais ou alguém que mora com você nasceu em:

África
Alasca
Europa Oriental
Oriente Médio
América do Sul
Sul da Ásia
Pacífico Ocidental



O que posso fazer para proteger meu bebê?

Vacine seu bebê nas primeiras 24 horas após o nascimento! A vacina contra a hepatite B é administrada em três ou quatro doses. Após a aplicação da primeira dose no hospital/centro de parto, a próxima dose geralmente é administrada quando o bebê tem entre 1 e 2 meses de idade. A última dose é administrada quando o bebê tem entre 6 e 18 meses de idade. Pergunte ao profissional de saúde do seu bebê quando ele deve retornar para receber a próxima dose da série.

Os bebês nascidos de pessoas infectadas com hepatite B precisam receber a primeira dose da vacina contra a hepatite B **E** uma injeção de imunoglobulina contra a hepatite B (hepatitis B immunoglobulin, HBIG) nas primeiras 12 horas após o nascimento.

