아 기 가 태 어 나 는 순 간 부 터 보 호 하 기 시 작 하 세 요



B형 간염 백신은 안전한가요?

B형 간염 백신은 매우 안전합니다. 가장 흔한 부작용은 주사 부위의 통증이나 미열입니다. 심각한 부작용은 드뭅니다.

출생 시 B형 간염 백신을 첫 번째로 접종하여 아기를 보호하기 시작하세요.



자세한 정보는 어디서 확인할 수 있나요?

- **담당 의료 서비스 제공자**
- **뉴저지주 보건부 백신 예방 가능 질병 프로그램(New Jersey Department of Health Vaccine Preventable Disease Program)**
  609-826-4861
  nj.gov/health/cd/vpdp.shtml
- **미국소아과학회(American Academy of Pediatrics, AAP)**
  출생 시 B형 간염 백신 첫 접종
- **예방접종행동연합(Immunization Action Coalition, IAC)**
  immunize.org/protect-newborns

개인의 구체적인 필요 사항에 대해서는 담당 의료 서비스 제공자와 상담하세요. 이 안내 책자는 의학적 조언을 대신할 수 없습니다.

이 안내 책자를 수정할 수 있도록 허락해 주신 워싱턴주 보건부(Washington State Department of Health)에 특별히 감사드립니다.

NJHealth New Jersey Department of Health

C55082

출생 시부터 아기를 보호하세요

B형 간염 백신으로



NJHealth New Jersey Department of Health

B형 간염이란 무엇인가요?

B형 간염은 간을 공격하는 바이러스에 의해 발생하는 질병입니다. B형 간염은 심각한 질병이나 간암을 유발할 수 있으며, 경우에 따라 사망에 이를 수도 있습니다.

B형 간염에 걸린 많은 사람은 아파 보이지도 않고 아프다고 느끼지도 않습니다. 다른 사람들은 식욕 부진, 복통, 극심한 피로 또는 피부나 눈이 노랗게 변하는 증상을 경험할 수 있습니다.

B형 간염은 어떻게 전파되나요?

B형 간염 바이러스에 감염된 혈액, 정액 또는 기타 체액이 감염에 취약한 사람의 몸에 들어가면 B형 간염이 전파됩니다. 다음과 같은 경로를 통해 바이러스에 감염될 수 있습니다.

- 출산(감염된 임신부로부터 출산 중 아기에게 전파)
- 감염된 파트너와의 성관계
- 감염된 사람과 면도기, 칫솔, 손톱깎이, 주사바늘 및 주사기, 혈당 측정기 등의 물품을 함께 사용하는 경우
- 감염된 사람의 혈액이나 열린 상처에 직접 접촉하는 경우
- 주사바늘에 찔리거나 기타 날카로운 기구로 인해 혈액에 노출되는 경우

B형 간염 바이러스는 식기 공유, 모유 수유, 포옹, 입맞춤, 손잡기, 기침 또는 재채기를 통해서는 **전파되지 않습니다**.



임신부는 왜 B형 간염 예방접종을 받아야 하나요?

B형 간염에 감염된 임신부는 신생아에게 B형 간염을 전염시킬 수 있습니다. 아기는 나이가 더 많은 어린이나 성인보다 B형 간염 감염에 맞서 싸우는 능력이 약합니다. 출생 시 B형 간염에 감염된 아기는 가장 심각한 형태의 B형 간염인 만성 B형 간염에 걸릴 확률이 90%입니다.

만성 B형 간염은 결국 간 손상, 간암, 심지어 사망을 포함한 심각한 건강 문제로 이어질 수 있습니다.

아기는 어떻게 B형 간염 바이러스에 노출될 수 있나요?

많은 경우, 임신부는 자신이 B형 간염에 감염되었다는 사실을 모르기 때문에 출산 중 아기에게 B형 간염 바이러스를 전염시킵니다. 다른 경우에는 B형 간염에 감염된 가족, 돌봄 제공자 또는 친구로부터 아기에게 바이러스가 전염됩니다. B형 간염에 감염된 사람 대부분은 아프다고 느끼지 않으며 자신이 이 바이러스를 보유하고 있다는 사실조차 모릅니다.

본인, 부모님 또는 함께 사는 사람이 다음 지역에서 태어났다면 본인과 아기가 B형 간염에 감염될 위험이 더 높습니다:

아프리카
알래스카
동유럽
중동
남아메리카
남아시아
서태평양



아기를 보호하려면 어떻게 해야 하나요?

출생 후 24시간 이내에 아기에게 예방접종을 받게 하세요! B형 간염 백신은 총 3회 또는 4회 접종합니다. 병원/출산 센터에서 첫 번째 접종을 받은 후, 일반적으로 생후 1-2개월에 다음 접종을 받습니다. 마지막 접종은 생후 6개월에서 18개월 사이에 받습니다. 아기가 다음 예방접종을 받으러 언제 다시 와야 하는지 담당 의료 서비스 제공자에게 문의하세요.

B형 간염에 감염된 사람에게서 태어난 아기는 출생 후 12시간 이내에 B형 간염 백신 첫 접종**과** B형 간염 면역글로불린(hepatitis B immunoglobulin, HBIG) 주사를 모두 맞아야 합니다.

