

B型肝炎疫苗安全嗎？

B型肝炎疫苗非常安全。最常見的副作用是注射部位疼痛或輕微發燒。嚴重的副作用很少見。

從寶寶出生時接種第一劑B型肝炎疫苗開始保護寶寶。



我可以在哪裡獲得更多資訊？

- **您的醫療服務提供者**
- **紐澤西州衛生廳疫苗可預防疾病計畫（New Jersey Department of Health Vaccine Preventable Disease Program）**
  609-826-4861
  nj.gov/health/cd/vpdp.shtml
- **美國兒科學會（American Academy of Pediatrics，AAP）**
  出生時接種B型肝炎疫苗第一劑
- **免疫接種行動聯盟（Immunization Action Coalition，IAC）**
  immunize.org/protect-newborns

請根據您的具體需求諮詢您的醫療服務提供者。本手冊不能取代醫療建議。

特別感謝華盛頓州衛生廳（Washington State Department of Health）允許我們修改本手冊。

NJHealth New Jersey Department of Health

C55082

從寶寶出生起就開始
透過接種

B型肝炎疫苗來保護寶寶



NJHealth New Jersey Department of Health

什麼是B型肝炎？

B型肝炎是由一種會攻擊肝臟的病毒所引起的疾病。B型肝炎可能導致嚴重疾病、肝癌，在某些情況下甚至可能導致死亡。

許多感染B型肝炎的人看起來或感覺上都沒有生病。其他人則可能出現食慾不振、胃痛、極度疲倦或皮膚或眼睛發黃等症狀。

B型肝炎是如何傳播的？

當含有B型肝炎病毒的血液、精液或其他體液進入易感者體內時，就會造成傳播。人們可能透過以下途徑感染此病毒：

- 分娩（在分娩過程中由受感染的孕婦傳染給嬰兒）
- 與受感染的伴侶發生性行為
- 與感染者共用刮鬍刀、牙刷、指甲剪、針頭和注射器以及血糖機等物品
- 直接接觸感染者的血液或開放性傷口
- 因針扎傷或其他銳器造成的血液暴露

B型肝炎病毒**不會**透過共用餐具、哺乳、擁抱、親吻、牽手、咳嗽或打噴嚏來傳播。



為什麼孕婦應該接種B型肝炎疫苗？

感染B型肝炎的孕婦可能會將疾病傳染給新生兒。與年齡較大的兒童或成人相比，嬰兒抵抗B型肝炎感染的能力較弱。出生時感染B型肝炎的嬰兒有90%的機率發展成慢性B型肝炎，這是該疾病最嚴重的形式。

慢性B型肝炎最終可能導致嚴重的健康問題，包括肝臟損傷、肝癌，甚至死亡。

嬰兒可能如何接觸到B型肝炎病毒？

在許多情況下，孕婦因為不知道自己已感染B型肝炎病毒，而在分娩過程中將病毒傳染給嬰兒。在其他情況下，病毒會由受感染的家庭成員、照顧者或朋友傳染給嬰兒。大多數感染B型肝炎病毒的人不會感到不適，也不知道自己帶有這種病毒。

如果您、您的父母或與您同住的人出生於以下地區，您和寶寶感染B型肝炎的風險就會更高：

非洲
阿拉斯加
東歐
中東
南美洲
南亞
西太平洋



我該如何保護我的寶寶？

請在寶寶出生後24小時內為寶寶接種疫苗！B型肝炎疫苗需要接種三劑或四劑。在醫院/生產中心接種第一劑後，通常會在寶寶1-2個月大時接種下一劑。最後一劑在寶寶6個月至18個月大之間接種。請向您的醫療服務提供者詢問，寶寶何時需要回來接種系列疫苗中的下一劑。

感染B型肝炎病毒者所生的嬰兒需要在出生後12小時內接種第一劑B型肝炎疫苗**和** B型肝炎免疫球蛋白（hepatitis B immunoglobulin，HBIG）　注射劑。

