

# Proteja seu bebê contra a coqueluche

A coqueluche (pertussis) é uma doença respiratória que se espalha facilmente e pode causar crises de tosse severas.

- Bebês com menos de 6 meses têm o maior risco de ficar muito doentes. Eles podem ter dificuldade para respirar e podem precisar ficar no hospital.
- Muitos bebês são infectados por familiares ou cuidadores que não sabem que estão doentes.

**Proteja seu bebê desde o nascimento! A vacinação durante a gravidez oferece proteção precoce quando os bebês estão em maior risco.**

## Como você pode prevenir a coqueluche?

Duas vacinas protegem contra a coqueluche:

- **Diphtheria, Tetanus, Pertussis (DTaP):** Para bebês e crianças pequenas (de seis semanas a seis anos)
- **Tetanus, diphtheria, pertussis (Tdap):** Para crianças mais velhas e adultos (a partir dos sete anos)

As gestantes devem receber a dTpa durante cada gestação (entre as semanas 27-36). Isso ajuda a proteger os bebês antes do nascimento e reduz muito o risco de coqueluche.

Receber a dTpa durante a gravidez funciona melhor, mas se você não recebeu e nunca a tomou antes, vacine-se logo após o parto.

Os efeitos colaterais geralmente são leves e podem incluir dor no braço, dor de cabeça ou dores musculares. Converse com seu profissional de saúde caso tenha dúvidas.




**Familiares e cuidadores também devem se vacinar pelo menos duas semanas antes do nascimento do bebê.**

**Para obter mais informações:**
nj.gov/health/cd/vpdp.shtml
bit.ly/4msBWV

Departamento de Saúde de Nova Jersey (New Jersey Department of Health) desenvolveu esse material para hospitais e centros de parto distribuírem (N.J.S.A.26:2N-7.1), disponível em pub.njleg.gov/bills/2012/PL13/275_.HTM