

保護您的寶寶免於百日咳

百日咳 (Pertussis) 是一種呼吸道疾病，傳染性高，並可能引起嚴重的咳嗽發作。

- 未滿 6 個月嬰兒重症風險最高。他們可能會呼吸困難，可能需要住院治療。
- 許多嬰兒遭尚未察覺自身患病的家人或照護者傳染。

守護寶寶，從出生開始！懷孕期間接種疫苗，可於寶寶風險最高階段提供早期防護。

如何預防百日咳?

有兩種疫苗能預防百日咳：

- **Diphtheria, Tetanus, Pertussis (DTaP):** 適合嬰兒及幼兒（六週至六歲）
- **Tetanus, diphtheria, pertussis (Tdap):** 適合較大的孩子和成人（七歲及以上）

孕婦應在每次懷孕期間（第 27-36 週）接種 Tdap。可於寶寶出生前提供保護，大幅降低嬰兒罹患百日咳的風險。

懷孕期間接種 Tdap 效果最佳，若本次孕期未能接種，且過往從未施打，請於生產後儘速完成接種。

副作用通常較輕微，常見症狀為接種部位手臂酸痛、頭痛或肌肉痠痛。如有疑問，請諮詢您的醫療保健提供者。



家人和照護者也應在寶寶出生前至少兩週接種疫苗。

更多相關資訊：
nj.gov/health/cd/vpdp.shtml
bit.ly/4msBWV

本資料由新澤西州衛生部 (New Jersey Department of Health) 製作，供醫院與生產中心發放 (N.J.S.A.26:2N-7.1)，網址：pub.njleg.gov/bills/2012/PL13/275 .HTM