

الآثار الجانبية للقاح COVID-19: ما يجب توقعه

يجب أن يحصل جميع الأفراد الذين تبلغ أعمارهم ستة أشهر فأكثر على جرعة واحدة على الأقل من لقاح COVID-19 لعام 2024-2025.

يمكن للأفراد تلقي لقاح COVID-19 في نفس الوقت مع اللقاحات الأخرى، بما في ذلك لقاح الإنفلونزا.



قد تحدث آثار جانبية نتيجة اللقاحات، وهذه الآثار قد تختلف من شخص لآخر. يمكن أن تظهر الأعراض خلال بضعة أيام من تلقي الجرعة، لكنها عادة ما تكون خفيفة وقد تشمل*:

- ألم، تورم واحمرار في الذراع أو الساق حيث تم أخذ اللقاح
- التعب
- النعاس، التهيج/البكاء، انخفاض الشهية**
- الحمى/القشعريرة
- الصداع
- آلام في العضلات أو المفاصل
- الغثيان/القيء
- تورم العقد الليمفاوية



* تكون الآثار الجانبية أكثر شيوعًا بعد الجرعات الإضافية لدى الفئة العمرية من 4 إلى 17 عامًا.
** وهي أكثر شيوعًا لدى الأطفال من عمر 6 أشهر إلى 3 سنوات.

• اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان الاحمرار أو الألم في مكان إعطاء الحقنة يزداد سوءًا بعد 24 ساعة، أو إذا لم تختف الآثار الجانبية بعد بضعة أيام.



• رغم أن ردود الفعل الشديدة مثل صعوبة التنفس نادرة، يُنصح بالاتصال بالرقم (911) إذا كنت تعتقد أن لديك أو لدى طفلك رد فعل تحسسي شديد.



لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: [cdc.gov/covid/vaccines/getting-your-covid-19-vaccine.html](https://www.cdc.gov/covid/vaccines/getting-your-covid-19-vaccine.html)

للعثور على لقاحات مجانية ومواقع التطعيم، تفضل بزيارة: nj.gov/health/vaccines/covid-19 أو امسح رمز الاستجابة السريعة صوتيًا [vaccines.gov](https://www.vaccines.gov).