

接种 COVID-19 疫苗的副作用： 可能会出现的情况



年满 6 月龄的每个人均应接种至少一剂 2024-2025 年度的 COVID-19 疫苗。

个人可在接种 COVID-19 疫苗的同时接种其他疫苗，包括流感疫苗。

疫苗的副作用因人而异。接种疫苗后的几天内可能会出现副作用，但通常症状较轻，可能包括：^{*}



- 疼痛、肿胀、手臂或腿部接种部位发红。
- 疲劳
- 嗜睡、易烦躁/哭泣及食欲下降**
- 发烧/打冷战
- 头痛
- 肌肉或关节疼痛
- 恶心/呕吐
- 淋巴结肿大

^{*} 在 4-17 岁人群中，接种额外剂量后出现副作用的情况更为常见。
^{**} 更常见于 6 月龄至 3 岁人群。



- 若接种 24 小时后，接种部位的红肿或疼痛情况加剧，或者副作用在几天后仍未消失，请及时联系您的医疗保健提供者。
- 虽然如呼吸困难之类的严重反应极为少见，但如果您认为您或您的孩子可能出现了严重的过敏反应，请拨打 911。

如需了解更多信息，请访问 cdc.gov/covid/vaccines/getting-your-covid-19-vaccine.html

如需查找免费疫苗和疫苗接种地点，请访问 nj.gov/health/vaccines/covid-19 或扫描二维码。
您也可以访问 vaccines.gov。

