

COVID-19 백신접종 부작용: 예상할 수 있는 반응



6개월 이상의 연령이라면 누구나 2024~2025년 COVID-19 백신을 1회 이상 접종받아야 합니다.

개인은 독감 백신을 포함해 다른 백신과 동시에 COVID-19 백신을 맞을 수 있습니다.

백신은 사람마다 다른 부작용을 보일 수 있습니다. 부작용은 접종을 맞고 며칠이 지나서 시작될 수 있으나, 일반적으로 경미하고, 다음을 포함할 수 있습니다.*



- 팔 또는 다리 접종 부위의 통증, 부기, 붉은 기
- 피로
- 졸음, 짜증/울음 및 식욕 감소**

- 열/오한
- 두통
- 근육통 또는 관절통
- 메스꺼움/구토
- 림프절의 부기

* 부작용은 4~17세 추가 접종자에게 더 흔히 나타납니다.

** 생후 6개월~3세 접종자에게 더 흔히 나타납니다.



- 주사를 맞은 부위의 붉은 기나 압통이 24시간 이후에도 심해지거나, 며칠이 지나도 부작용이 사라지지 않는 경우, 담당 의료 서비스 제공자에게 문의하세요.
- 호흡 곤란 등 심각한 반응은 흔하지 않지만, 본인 혹은 자녀가 심각한 알레르기 반응을 보인다고 판단하시는 경우에는 911에 전화하세요.

더 자세한 정보는 cdc.gov/covid/vaccines/getting-your-covid-19-vaccine.html 을 참조해 주시기 바랍니다.

무료 백신 및 백신 접종 위치는 nj.gov/health/vaccines/covid-19 또는 QR 코드 스캔을 통해 확인하실 수 있습니다. 추가로 vaccines.gov 에서도 동일한 정보를 제공하고 있습니다.

