

Efeitos colaterais da vacina contra a COVID-19: o que esperar?



Todas as pessoas, a partir dos seis meses de idade, devem receber pelo menos uma dose da vacina contra a COVID-19 para 2024-2025.

Elas podem receber a vacina contra a COVID-19 juntamente com outras vacinas, incluindo a vacina contra a gripe.

As vacinas podem ter efeitos colaterais que variam de pessoa para pessoa. Esses efeitos podem ter início alguns dias após a injeção, mas normalmente são leves e podem incluir: *



- Dor, inchaço e vermelhidão no braço ou perna que recebeu a injeção
- Cansaço
- Sonolência, irritabilidade/choro e diminuição do apetite**
- Febre/calafrios
- Dor de cabeça
- Dor muscular ou articular
- Náusea/vômitos
- Inchaço nos gânglios linfáticos

* Efeitos colaterais são mais comuns após doses adicionais nas pessoas entre 4 e 17 anos de idade.

** Mais comuns em bebês e crianças entre 6 meses e 3 anos de idade.



- Entre em contato com seu médico se a vermelhidão ou a sensibilidade no local da injeção piorar após 24 horas ou se os efeitos colaterais não desaparecerem após alguns dias.
- **Embora reações graves, como dificuldade em respirar, sejam raras, ligue para 911 se acreditar que você ou seu filho está passando por uma reação alérgica grave.**

Para obter mais informações, visite cdc.gov/covid/vaccines/getting-your-covid-19-vaccine.html

Para encontrar vacinas gratuitas e locais de vacinação, visite nj.gov/health/vaccines/covid-19 ou leia o código QR. Você também pode visitar o site vaccines.gov.

