

# Efectos secundarios de la vacuna del COVID-19: Qué esperar



Todas las personas mayores de 6 meses deben recibir por lo menos una dosis de la vacuna del COVID-19 2024-2025.

La vacuna del COVID-19 se puede administrar al mismo tiempo que otras vacunas, incluyendo la vacuna de la gripe.

Las vacunas pueden tener efectos secundarios que pueden variar de una persona a otra. Pueden comenzar pocos días después de la inyección, pero suelen ser leves y pueden incluir:\*



- Dolor, hinchazón y enrojecimiento en el brazo o la pierna donde se administró la inyección.
- Cansancio
- Somnolencia, irritabilidad/llanto y disminución del apetito\*\*
- Fiebre/escalofríos
- Dolor de cabeza
- Dolor de músculos o articulaciones
- Náuseas/vómitos
- Nódulos linfáticos hinchados

\* Los efectos secundarios son más frecuentes después de más dosis en menores de 4-17 años.

\*\* Son más frecuentes en los bebés y niños de 6 meses a 3 años.



- Hable con su proveedor de atención médica si el enrojecimiento o la sensibilidad en el lugar donde se administró la inyección empeoran después de 24 horas o si los efectos secundarios no desaparecen después de unos días.
- Aunque las reacciones graves, como la dificultad para respirar, son raras, llame al 911 si cree que usted o su hijo podrían estar teniendo una reacción alérgica grave.

Para obtener más información, visite [cdc.gov/covid/vaccines/getting-your-covid-19-vaccine.html](https://cdc.gov/covid/vaccines/getting-your-covid-19-vaccine.html)

Para buscar lugares donde administran vacunas y vacunas sin costo, visite [nj.gov/health/vaccines/covid-19](https://nj.gov/health/vaccines/covid-19) o escanee el código QR. También puede visitar [vaccines.gov](https://vaccines.gov).

