

Tác Dụng Phụ của việc Chủng Ngừa COVID-19: Các Tác Dụng Phụ Thường Gặp



Tất cả mọi người từ sáu tháng tuổi trở lên nên tiêm ít nhất một liều vắc-xin COVID-19 cho năm 2024-2025.

Cá nhân có thể tiêm vắc-xin COVID-19 cùng với các vắc-xin khác, bao gồm cả vắc-xin cúm.

Các vắc-xin có thể gây ra các tác dụng phụ khác nhau giữa mọi người. Tác dụng phụ có thể bắt đầu xảy ra vài ngày sau khi tiêm nhưng thường chỉ ở mức độ nhẹ và có thể bao gồm:*



- Đau, sưng và đỏ tại vết tiêm trên cánh tay hoặc chân.
- Sốt/ớn lạnh
- Mệt mỏi
- Đau đầu
- Buồn ngủ, cáu kỉnh/quấy khóc
- Đau cơ hoặc khớp
- Buồn nôn/nôn mửa
- Sưng hạch bạch huyết
- Giảm cảm giác ngon miệng**

* Các tác dụng phụ thường gặp hơn sau khi tiêm các liều bổ sung ở những người từ 4-17 tuổi.

** Thường gặp hơn ở trẻ em từ 6 tháng đến 3 tuổi.



- Hãy trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị nếu vết đỏ hoặc đau ở chỗ tiêm trở nên trầm trọng hơn sau 24 giờ hoặc nếu tác dụng phụ không hết sau vài ngày.
- Mặc dù các phản ứng nghiêm trọng như khó thở thường hiếm gặp, hãy gọi 911 nếu quý vị cho rằng quý vị hoặc con quý vị có thể đang có phản ứng dị ứng nghiêm trọng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập cdc.gov/covid/vaccines/getting-your-covid-19-vaccine.html

Để tìm các loại vắc-xin miễn phí và địa điểm tiêm vắc-xin, vui lòng truy cập nj.gov/health/vaccines/covid-19 hoặc quét mã QR. Quý vị cũng có thể truy cập vaccines.gov.

Cập nhật tháng 1 năm 2025

