



CIAŻA, PŁODNOŚĆ I SZCZEPIONKI PRZECIWKO COVID-19



Przyjmij szczepionkę przeciwko COVID-19, jeśli jesteś w ciąży, planujesz ciążę lub karmisz piersią.

- Przyjęcie szczepionki podczas ciąży powoduje wytworzenie przeciwciał (ochrony), które mogą pomóc w utrzymaniu zdrowia i zapewnieniu bezpieczeństwa matki oraz dziecka.
- Prawie 90% dzieci hospitalizowanych z powodu COVID-19 miało matki, które nie otrzymały szczepionki w trakcie ciąży¹.



COVID-19 jest niebezpieczniejszy dla osób w ciąży.

- Osoby ciężarne są bardziej narażone na powikłania, które mogą mieć wpływ na ciążę, takie jak przedwczesny poród (przed 37 tygodniem) czy poronienie (utrata ciąży).



Przyjmij szczepionkę przeciwko COVID-19 w dowolnym momencie ciąży.

- Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (Disease Control and Prevention, CDC) i inne organizacje medyczne zalecają szczepienia w dowolnym momencie ciąży.
- Osoby ciężarne mogą przyjąć szczepionki przeciwko COVID-19 i grypie w tym samym czasie.



Szczepionki przeciwko COVID-19 nie wpływają na DNA i nie powodują problemów z zajściem w ciążę ani z płodnością.

- Szczepionki przeciwko COVID-19 nie ingerują w ludzkie DNA ani się z nim nie łączą.
- Są również bezpieczne dla osób starających się zajść w ciążę.



Jeśli poszukujesz szczepionki przeciwko COVID-19 i chcesz dowiedzieć się więcej:

- Odwiedź stronę nj.gov/health/vaccines/covid-19 lub zeskanuj kod QR.
- Odwiedź stronę vaccines.gov.
- Zadzwoń na infolinię CDC: 1-800-232-0233.
- Odwiedź stronę cdc.gov/covid/vaccines/pregnant-or-breastfeeding.html.

