



THAI KỲ, KHẢ NĂNG SINH SẢN VÀ VẮC-XIN COVID-19



Tiêm vắc-xin COVID-19 nếu quý vị đang mang thai, lên kế hoạch mang thai hoặc đang cho con bú.

- Tiêm vắc-xin trong thời kỳ mang thai sẽ tạo ra kháng thể (bảo vệ) có thể giúp quý vị và em bé khỏe mạnh và an toàn.
- Gần 90% trẻ sơ sinh phải nhập viện do COVID-19 có mẹ không tiêm vaccine COVID-19 trong suốt thai kỳ.¹



COVID-19 nguy hiểm hơn đối với người mang thai.

- Những người mang thai có nguy cơ cao gặp phải các biến chứng có thể ảnh hưởng đến thai kỳ, như sinh non (sinh trước 37 tuần) và sảy thai (mất thai).



Tiêm vắc-xin COVID-19 bất cứ lúc nào trong thời kỳ mang thai.

- Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và các tổ chức y tế khác khuyến cáo nên tiêm vắc-xin vào bất kỳ thời điểm nào trong thai kỳ.
- Người mang thai có thể tiêm vắc-xin COVID-19 và vắc-xin cúm cùng một lúc.



Vắc-xin COVID-19 không ảnh hưởng đến DNA hoặc gây ra vấn đề về khả năng mang thai hoặc khả năng sinh sản.

- Vắc-xin COVID-19 không ảnh hưởng hoặc trộn lẫn với DNA của chúng ta.
- Vắc-xin cũng an toàn cho những người đang có ý định mang thai.



Để tìm kiếm Vắc-xin COVID-19 và biết thêm thông tin:

- Truy cập nj.gov/health/vaccines/covid-19 hoặc quét mã QR.
- Truy cập vaccines.gov.
- Gọi tới Đường dây Thông tin của CDC theo số 1-800-232-0233.
- Truy cập cdc.gov/covid/vaccines/pregnant-or-breastfeeding.html.



¹ kffhealthnews.org/news/article/covid-coronavirus-vaccine-shot-pregnancy-babies-protection

