

Causes communes de la perte auditive du nourrisson

Toutes les causes ne sont pas connues, mais certaines le sont :

- Des facteurs génétiques sont à l'origine d'environ 50 % des cas de perte auditive congénitale.
- Séjour de plus de cinq jours en unité de soins intensifs néonataux (USIN) pour des raisons telles que la prématurité et le manque d'oxygène à la naissance.
- Les infections pendant la grossesse, telles que le cytomégalovirus (CMV), peuvent endommager l'oreille interne en développement. Visitez nationalcmv.org pour plus d'informations.
- Les médicaments, y compris certains antibiotiques et diurétiques, peuvent être toxiques pour l'oreille interne.

Si vous avez des questions sur l'audition de votre bébé, parlez-en à son médecin.



Utilisez le code QR ci-dessous pour trouver cette brochure dans les langues suivantes :

English
Español
한국어
Türkçe

Polski
العربية
Português
kreyòl ayisyen

français
বাংলা
हिन्दी



New Jersey Early Hearing Detection and Intervention (détection et intervention précoce en matière d'audition)

nj.gov/health/fhs/nbs/ehdi

Email : EHDI@doh.nj.gov
Téléphone : 609-292-5676
Fax : 609-633-7820



Diagnostic



Diagnostic



Intervention précoce



Dépistage auditif du nouveau-né

New Jersey Early Hearing Detection & Intervention (détection et intervention précoce en matière d'audition)



Détection et intervention précoces en matière d'audition (Early Hearing Detection and Intervention, EHDI)

EHDI est une initiative nationale de santé publique qui soutient les '1-3-6' lignes directrices :

- Dépistage de la perte auditive chez tous les nouveau-nés avant l'âge d'un mois.
- Diagnostic complet du dépistage auditif avant l'âge de trois mois pour les nourrissons qui n'ont pas réussi le dépistage auditif.
- Vous pouvez inscrire les enfants chez qui une perte auditive a été diagnostiquée à des services d'intervention précoce au plus tard à l'âge de six mois.

Environ 90 % des bébés atteints de perte auditive sont nés de parents entendants.

Pourquoi faut-il dépister l'audition de mon bébé ?

- La loi du New Jersey impose un dépistage auditif à tous les nouveau-nés.
- La plupart des bébés entendent bien à la naissance, mais ce n'est pas toujours le cas.
- Les bébés dont la perte auditive n'est pas détectée tôt auront des difficultés à apprendre.
- Le dépistage auditif est rapide, sûr et indolore.
- Lorsque vous recevrez les résultats du dépistage auditif de votre bébé, des recommandations de suivi vous seront fournies, si nécessaire.

Il y a des choses qu'un bébé ayant une audition normale devrait pouvoir faire :

De la naissance à 3 mois :

- Cligne des yeux ou sursaute lorsqu'il entend un son fort et soudain.
- Lorsqu'on lui parle, il se tait ou sourit.
- Fait des sons comme « ohh » ou « ahh ».

De 3 à 6 mois :

- S'oriente vers les sons avec les yeux.
- Commence à babiller (baba, mama, gaga).
- Fait de nombreux sons, couinements et gloussements.

De 6 à 9 mois :

- Tourne la tête vers les sons forts.
- Comprend « non » ou « bye-bye ».
- Babille (baba, mama, gaga).

De 9 à 12 mois :

- Répéter des mots simples et des sons que vous produisez.
- Utilise correctement les mots « maman » ou « papa ».
- Réagit au chant ou à la musique.
- Indique ses jouets et objets préférés lorsqu'on le lui demande.

Les enfants commencent à apprendre la parole et le langage dès les premiers mois de leur vie. Les enfants souffrant d'une perte auditive qui reçoivent une aide précoce développent de meilleures aptitudes linguistiques et apprennent à communiquer avec succès.

Pourquoi mon bébé a-t-il besoin d'un autre test auditif ?

Si votre bébé n'a pas passé le test de dépistage auditif, vous vous posez peut-être des questions. Certains bébés ont besoin d'un autre test pour les raisons suivantes :

- Fluide dans l'oreille.
- Bruit dans la salle d'examen.
- Le bébé a beaucoup bougé.
- Le bébé souffre d'une perte auditive.

Si votre bébé ne passe pas le test de dépistage auditif, veillez à ce qu'il subisse un nouveau test dès que possible. La plupart des bébés qui ont besoin d'un autre test auditif ont une audition normale, mais certains présentent une perte auditive.

Pourquoi est-il important d'effectuer un nouveau test auditif dès que possible ?

Les tests sont le seul moyen de savoir si votre bébé souffre d'une perte auditive. Si la perte auditive est détectée tôt, le bébé s'en portera d'autant mieux. Si votre bébé souffre d'une perte auditive, nous pouvons l'aider de différentes manières.

