

शिशुओं में श्रवण हानि के सामान्य कारण

सभी कारण ज्ञात नहीं हैं लेकिन कुछ हैं:

- जन्मजात श्रवण हानि के लगभग 50% मामलों का कारण आनुवंशिक कारक होते हैं।
- समय से पहले जन्म और जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी जैसे कारणों से पांच दिनों से अधिक समय तक नवजात गहन देखभाल (NICU) में रहना।
- गर्भविस्था के दौरान साइटोमेगालोवायरस (CMV) जैसे संक्रमण विकासशील आंतरिक कान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए nationalcmv.org पर जाएं।
- कुछ एंटीबायोटिक्स और मूत्रवर्धक दवाएं आंतरिक कान के लिए विषाक्त हो सकती हैं।

यदि आपके शिशु की सुनने की क्षमता के बारे में आपके कोई प्रश्न हों, तो उनके स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से बात करें।

इस ब्रोशर को निम्नलिखित भाषाओं में खोजने के लिए नीचे दिए गए QR कोड का उपयोग करें:

English
Español
한국어
Türkçe

Polski
العربية
Português
kreyòl ayisyen

français
বাংলা
हिन्दी



न्यू जर्सी प्रारंभिक सुनवाई का पता लगाना
और हस्तक्षेप

nj.gov/health/fhs/nbs/ehdi

इमेल: EHDI@doh.nj.gov

फोन: 609-292-5676

फैक्स: 609-633-7820



स्क्रीनिंग



निदान



समय से पहले
हस्तक्षेप



नवजात शिशु की श्रवण जांच

न्यू जर्सी प्रारंभिक सुनवाई का पता लगाना
और हस्तक्षेप



शिशु श्रवण पहचान और हस्तक्षेप (EHDI)

EHDI एक राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल है जो '1-3-6' दिशानिर्देशों का समर्थन करती है:

- एक महीने की उम्र से पहले प्रत्येक नवजात शिशु की श्रवण हानि की जांच करें
- तीन महीने की उम्र से पहले उन शिशुओं के लिए पूर्ण नैदानिक ऑडियोलॉजिक मूल्यांकन जो अपनी श्रवण जांच में पास नहीं होते हैं
- श्रवण हानि से पीड़ित बच्चों को छह महीने की आयु से पहले प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं में नामांकित करें

सुनने की क्षमता में कमी वाले लगभग **90%** बच्चे ऐसे माता-पिता से पैदा होते हैं जो सुन सकते हैं।

मेरे बच्चे की सुनने की क्षमता की जांच क्यों करवानी चाहिए?

- न्यू जर्सी कानून के अनुसार सभी नवजात शिशुओं के लिए सुनने की क्षमता की जांच करवाना ज़रूरी है।
- अधिकांश बच्चे जन्म के समय अच्छी तरह सुन सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं सुन पाते।
- जिन बच्चों की सुनने की क्षमता में कमी का पता जल्दी नहीं चलता, उन्हें सीखने में कठिनाई होती है।
- सुनने की जांच जल्दी, सुरक्षित और दर्द रहित होती है।
- जब आपको अपने बच्चे की सुनने की क्षमता की जांच के नतीजे मिलेंगे, तो ज़रूरत पड़ने पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सिफारिशें दी जाएंगी।

कुछ चीजें जो सामान्य श्रवण क्षमता वाले बच्चे को करने में सक्षम होना चाहिए:

जन्म से 3 माह की आयु तक:

- अचानक तेज आवाज होने पर पलकें झपकाना या उछलना
- जब उससे बात की जाती है तो वह चुप हो जाता है या मुस्कुराता है
- 'ओह' या 'आह' जैसी आवाज़ें निकालता है

3 से 6 महीने की उम्र:

- आँखों से ध्वनियों की ओर देखता है
- बड़बड़ाना शुरू करता है (बाबा, मामा, गगा)
- कई आवाज़ें, चीखें और ठहाके लगाता है

6 से 9 महीने की उम्र:

- तेज़ आवाज़ों की ओर सिर घुमाता है
- 'नहीं-नहीं' या 'बाय-बाय' को समझता है
- बड़बड़ाना है (बाबा, मामा, गगा)

9 से 12 महीने की उम्र:

- आपके द्वारा बोले जाने वाले सरल शब्दों और ध्वनियों को दोहराता है
- 'मामा' या 'दादा' का सही इस्तेमाल करता है
- गायन या संगीत पर प्रतिक्रिया करता है
- पूछे जाने पर पसंदीदा खिलौनों और वस्तुओं की ओर इशारा करता है

बच्चे जीवन के पहले कुछ महीनों में ही बोलना और भाषा सीखना शुरू कर देते हैं। सुनने की क्षमता में कमी वाले बच्चे, जिन्हें जल्दी मदद मिल जाती है, वे बेहतर भाषा कौशल विकसित करते हैं और सफलतापूर्वक संवाद करना सीखते हैं।

मेरे बच्चे को एक और श्रवण परीक्षण की आवश्यकता क्यों है?

यदि आपका बच्चा श्रवण जांच में पास नहीं हुआ है, तो आपके मन में कुछ सवाल हो सकते हैं। कुछ बच्चों को निम्नलिखित कारणों से एक और परीक्षण की आवश्यकता हो सकती है:

- कान में तरल पदार्थ
- परीक्षण कक्ष में शोर
- बच्चा बहुत हिल रहा था
- बच्चे को सुनने की क्षमता कम हो गई है

यदि आपका बच्चा श्रवण जांच में पास नहीं होता है, तो सुनिश्चित करें कि जितनी जल्दी हो सके उसका फिर से परीक्षण किया जाए। अधिकांश बच्चे जिन्हें एक और श्रवण परीक्षण की आवश्यकता होती है, उनकी सुनने की क्षमता सामान्य होती है, लेकिन कुछ बच्चों को सुनने की क्षमता कम हो सकती है।

जल्द से जल्द एक और श्रवण परीक्षण करवाना क्यों महत्वपूर्ण है?

यह जानने का एकमात्र तरीका है कि आपके बच्चे को सुनने में कमी है या नहीं। जितनी जल्दी सुनने की क्षमता में कमी का पता चल जाए, बच्चे के लिए उतना ही बेहतर है। अगर आपके बच्चे को सुनने में कमी है, तो हम कई तरीकों से उसकी मदद कर सकते हैं।

