

유아 청력 상실의 일반적 원인

모든 원인이 밝혀진 것은 아니지만, 그 일부는 다음과 같습니다:

- 유전적 요인은 선천성 청력 손실의 대략 50%를 차지합니다.
- 조산이나 출생 시 산소 부족으로 인해 신생아 중환자실(NICU)에서 5일 이상 치료를 받을 경우.
- 거대세포바이러스(CMV) 등과 같은 질환에 임신 중 감염될 경우 귀 내부 발달에 손상을 미칠 수 있습니다. 보다 자세한 정보를 알아보시려면 nationalcmv.org를 방문해주시요.
- 특정 항생제와 이뇨제를 포함한 의약품은 귀 내부 발달에 유해할 수 있습니다.

아기의 청력 건강과 관련하여 문의 사항이 있으시다면, 담당 의료 제공자와 상담해주시기 바랍니다.

아래 QR 코드를 스캔하시면 본 팸플릿을 다음 언어로 받아보실 수 있습니다:

English
Español
한국어
Türkçe

Polski
العربية
Português
kreyòl ayisyen

français
বাংলা
हिन्दी



New Jersey 청력 손상 조기 탐지
및 중재

nj.gov/health/fhs/nbs/ehdi

이메일: EHDI@doh.nj.gov

전화: 609-292-5676

팩스: 609-633-7820



신생아 청력 검진

New Jersey 청력 손상 조기 탐지
및 중재



청력 손상 조기 탐지 및 중재 (EHDI)

EHDI는 '1-3-6' 가이드라인을 지원하는 국가 공중보건 이니셔티브의 하나입니다:

- 생후 **일** 개월이 되기 전 모든 신생아에 대해 청력 손상 검진
- 생후 **삼** 개월이 되기 전 청력 검진을 통과하지 못한 아기에 대해 진단을 위한 청력 평가 수행
- 생후 **육** 개월 이전까지 청력 손상으로 진단된 아기를 조기 중재 서비스에 등록

청력 손상이 있는 아기의 대략 **90%**
는 청력이 정상적인 부모에게서
태어납니다.

아기를 위한 청력 검진을 받아야 하는 이유는 무엇인가요?

- New Jersey 주법에 따라 모든 신생아는 청력 검진을 받아야 합니다.
- 대부분 아기는 출생 시 잘 들을 수 있지만, 몇몇 아기는 그렇지 못합니다.
- 청력 손상을 조기 발견하지 못한 아기는 학습에 지장을 받게 됩니다.
- 청력 검진은 빠르고 안전하며 통증이 없습니다.
- 아기의 청력 검진 결과에는 필요한 경우 추가 검사에 관한 권고 사항이 제공될 수 있습니다.

정상적인 청력을 가진 아기가 할 수 있어야 하는 사항:

출생부터 3개월:

- 갑작스럽게 큰 소리가 날 경우 눈을 깜빡이거나 점프함
- 말을 걸면, 조용해지거나 미소를 보임
- '어' 또는 '아'와 같은 소리를 냄

3개월에서 6개월:

- 소리가 나는 곳으로 시선을 돌림
- 웅얼이 시작(아바, 마마, 가가)
- 다양한 소리, 까르륵 소리나 킬킬거리는 소리 사용

6개월에서 9개월:

- 큰 소리가 나는 곳으로 고개를 돌림
- '안 돼' 또는 '바이바이'와 같은 말을 이해함
- 웅얼이 지속(아바, 마마, 가가)

9개월에서 12개월:

- 보호자가 하는 단순한 말과 소리를 따라 함
- '엄마' 또는 '아빠'를 올바르게 사용함
- 노래나 음악에 반응함
- 물어보면 좋아하는 장난감과 물체를 가리킴

아기는 생후 첫 몇 개월 이내에 발화
및 언어에 관한 학습을 시작합니다.

청력 손상이 있지만, 조기에
중재를 받은 아기는 더 높은 언어
능력 발달을 이루고 성공적으로
의사소통하는 방법을 학습할 수
있습니다.

제 아기에게 청력 검사가 한 번 더 필요한 이유는 무엇인가요?

아기가 청력 검진을 통과하지 못했다면, 몇 가지 질문이 있을 수 있습니다. 일부 아기는 다음과 같은 이유 때문에 검사를 한 번 더 받아야 할 수 있습니다:

- 귀에 물이 찬 경우
- 검사실이 시끄러웠던 경우
- 아기가 가만히 있지 못한 경우
- 아기에게 청력 손상이 있는 경우

아기가 청력 검진을 통과하지 못했다면, 최대한 빨리 한 번 더 검사를 받을 수 있도록 해야 합니다. 청력 검사를 한 번 더 받는 아기의 대부분은 청력이 정상적인 것으로 나타나지만, 일부 아기는 청력 손상이 있을 수 있습니다.

청력 검사를 최대한 빨리 한 번 더 받는 것이 중요한 이유는 무엇인가요?

아기에게 청력 손상이 있는지 확인하는 유일한 방법은 검사를 받는 방법뿐입니다. 청력 손상은 발견이 빠를수록 아기에게 더 좋은 결과를 가져올 수 있습니다. 아기에게 청력 손상이 있을 경우, 도움을 받을 수 있는 방법은 여러 가지입니다.

