

Najczęstsze przyczyny utraty słuchu przez niemowlęta

Nie wszystkie przyczyny są znane, ale niektóre z nich to:

- **Czynniki genetyczne** są przyczyną około 50% przypadków wrodzonej utraty słuchu.
- **Pobyt na oddziale intensywnej terapii noworodków (NICU) przez okres dłuższy niż pięć dni** z powodów takich, jak wcześniactwo lub brak tlenu przy porodzie.
- **Infekcje w trakcie ciąży** takie, jak cytomegalowirus (CMV) mogą uszkodzić rozwijający się narząd ucha wewnętrznego. Więcej informacji znajduje się na stronie nationalcmv.org.
- **Leki**, w tym niektóre antybiotyki i leki moczopędne mogą być toksyczne dla ucha wewnętrznego.

Jeśli masz pytania o słuchu Twojego dziecka, porozmawiaj ze swoim lekarzem pediatrą.



Zeskanuj kod QR, aby otrzymać tę broszurę w następujących językach:

English
Español
한국어
Türkçe

Polski
العربية
Português
kreyòl ayisyen

français
বাংলা
हिन्दी



New Jersey Early Hearing Detection and Intervention

nj.gov/health/fhs/nbs/ehdi

E-mail: EHDI@doh.nj.gov

Telefon: 609-292-5676

Faks: 609-633-7820



Badanie



Diagnoza



Wczesna interwencja



Badanie słuchu noworodka

New Jersey Early Hearing Detection & Intervention



Early Hearing Detection and Intervention (EHDI)

EHDI jest państwową, publiczną inicjatywą zdrowotną, która wspiera wytyczne '1-3-6':

- Badaj słuch u każdego noworodka przed ukończeniem pierwszego miesiąca życia
- Przeprowadź pełną ocenę audiologiczną przed ukończeniem trzeciego miesiąca życia niemowląt, które nie przeszły pozytywnie badania słuchu
- Dzieci ze zdiagnozowaną utratą słuchu należy zapisać do ośrodków wczesnej interwencji przed ukończeniem szóstego miesiąca życia

Okolo 90% dzieci z utratą słuchu rodzi się rodzicom słyszącym.

Dlaczego mojemu dziecku powinno się zbadać słuch?

- Prawo New Jersey wymaga wykonania badania słuchu u każdego noworodka.
- Większość dzieci słyszy dobrze po narodzinach, ale niewielka część nie.
- Dzieci, u których utrata słuchu nie zostanie wcześnie zdiagnozowana, doświadczą problemów w nauce.
- Badanie słuchu jest szybkie, bezpieczne i bezbolesne.
- Kiedy otrzymasz wyniki badania słuchu swojego dziecka, w razie potrzeby zostaną przedstawione rekomendacje do dalszych działań.

Oto kilka rzeczy, które powinno umieć wykonać dziecko z prawidłowym słuchem:

Od urodzenia do 3. miesiąca:

- Mruga lub podskakuje na skutek nagłego, głośnego dźwięku
- Ucisza się lub uśmiecha, kiedy się do niego mówi
- Wydaje dźwięki, jak "ooo" lub "aaa"

Od 3. do 6. miesiąca:

- Kieruje oczy w stronę dźwięku
- Zaczyna gaworzyć (baba, mama, gaga)
- Wydaje wiele dźwięków, pisków i chichotów

Od 6. do 9. miesiąca:

- Odwraca głowę w kierunku głośniejszych dźwięków
- Rozumie "nie-nie" czy "pa-pa"
- Gaworzy (baba, mama, gaga)

Od 9. do 12. miesiąca:

- Powtarza proste słowa i dźwięki, które wydajesz
- Poprawnie używa słów "mama" i "tata"
- Reaguje na śpiew lub muzykę
- Poproszone wskazuje ulubioną zabawkę i przedmioty

Dzieci uczą się mowy i języka w pierwszych miesiącach życia. Dzieci z utratą słuchu, które zostały objęte wczesną pomocą, rozwijają lepsze zdolności językowe i uczą się skutecznej komunikacji.

Dlaczego moje dziecko potrzebuje kolejnego badania słuchu?

Jeśli Twoje dziecko nie przeszło pozytywnie badania słuchu, możesz mieć kilka pytań. Niektóre dzieci mogą potrzebować ponownego testu, z uwagi na:

- Płyn w uszach
- Hałas w pokoju badań
- Dziecko dużo się poruszało
- Dziecko doznało utraty słuchu

Jeśli Twoje dziecko nie przeszło pozytywnie badania słuchu, upewnij się, że zostanie ponownie zbadane tak szybko, jak to możliwe. Większość dzieci, które wymagają ponownego badania słyszy normalnie, ale część z nich doznała utraty słuchu.

Dlaczego konieczne jest wykonanie ponownego badania tak szybko, jak to możliwe?

Badanie jest jedynym sposobem, aby potwierdzić, czy Twoje dziecko doznało utraty słuchu. Im wcześniej utrata słuchu zostanie wykryta, tym lepiej dla dziecka. Jeśli Twoje dziecko doznało utraty słuchu, możemy pomóc na wiele sposobów.

