

Causas comuns de perda de audição em bebês

Não se sabe todas as causas, mas algumas são:

- **Fatores genéticos** causam cerca de 50% dos casos de perda de audição congênita.
- **Internação em terapia intensiva neonatal (UTIN) por mais de cinco dias** devido a prematuridade ou falta de oxigênio ao nascer.
- **Infecções durante a gravidez**, como o citomegalovírus (CMV), podem danificar o ouvido interno em desenvolvimento. Acesse nationalcmv.org para mais informações.
- **Medicamentos**, incluindo certos antibióticos e diuréticos, podem ser tóxicos para o ouvido interno.

Em caso de dúvidas sobre a audição do seu bebê, fale com o seu médico.



Use o código QR abaixo para acessar este folheto nos seguintes idiomas:

English
Español
한국어
Türkçe

Polski
العربية
Português
kreyòl ayisyen

français
বাংলা
हिन्दी



Detecção e Intervenção Auditiva Precoce de New Jersey

nj.gov/health/fhs/nbs/ehdi

E-mail: EHDI@doh.nj.gov

Telephone: 609-292-5676

Fax: 609-633-7820



Triagem



Diagnóstico



Intervenção precoce



Triagem Auditiva Neonatal

Detecção e Intervenção Auditiva Precoce de New Jersey



Detecção e Intervenção Auditiva Precoce (EHDI)

A EHDI é uma iniciativa nacional de saúde pública que apoia as diretrizes '1-3-6' :

- Triagem de todos os recém-nascidos para perda auditiva antes de um mês de idade
- Avaliação audiológica diagnóstica completa antes dos três meses de idade para bebês que não passarem na triagem de audição
- Inscrição das crianças diagnosticadas com perda auditiva em serviços de intervenção precoce até seis meses de idade

Cerca de 90% dos bebês com perda auditiva nascem de pais ouvintes.

Porque a triagem da audição do meu bebê deve ser realizada?

- A legislação de New Jersey obriga a triagem de audição para todos os recém-nascidos.
- A maioria dos bebês pode ouvir bem ao nascer, mas alguns não conseguem.
- Os bebês cuja perda auditiva não é descoberta precocemente terão dificuldades de aprendizado.
- A triagem de audição é rápida, segura e indolor.
- Ao receber os resultados da triagem de audição do seu bebê, serão dadas recomendações de acompanhamento, se necessário.

Coisas que um bebê com audição normal deve conseguir fazer:

Do nascimento até os 3 meses:

- Pisca ou salta quando há um som súbito e alto
- Quando se fala com ele, fica quieto ou sorri
- Faz sons como 'ohh' ou 'ahh'

De 3 a 6 meses:

- Olha em direção dos sons
- Começa a balbuciar (babá, mamá, gagá)
- Usa muitos sons, gritos agudos e risadinhas

De 6 a 9 meses:

- Vira a cabeça para a direção de sons altos
- Entende “não-não” ou “tchau-tchau”
- Balbucia (babá, mamá, gagá)

De 9 a 12 meses:

- Repete as palavras simples e sons que você faz
- Usa “mamá” ou “papá” corretamente
- Responde ao canto ou à música
- Aponta para brinquedos e objetos favoritos quando perguntado

As crianças começam a aprender fala e linguagem nos primeiros meses de vida. Crianças com perda auditiva que recebem ajuda precoce desenvolvem melhores competências linguísticas e aprendem a se comunicar com sucesso.

Porque meu bebê precisa de outro teste de audição?

Se o seu bebê não passou numa triagem de audição, talvez você tenha algumas dúvidas. Alguns bebês podem precisar de outro teste em função de:

- Fluido no ouvido
- Barulho na sala de testes
- O bebê se mexia muito
- O bebê tem perda auditiva

Se o seu bebê não passar numa triagem de audição, faça um novo teste assim que possível. A maioria dos bebês que precisam de outro teste de audição tem audição normal, mas alguns apresentarão perda auditiva.

Por que é importante fazer outro teste auditivo o mais rápido possível?

O teste é a única maneira de saber se o seu bebê tem perda auditiva. Quanto mais cedo a perda auditiva for descoberta, melhor para o bebê. Se o seu bebê tiver perda auditiva, podemos ajudar de várias formas.

