

Bebeklerde duyma kaybının yaygın nedenleri

Tüm nedenler bilinmemekle birlikte, bazı nedenler aşağıda sıralanmıştır:

- **Genetik faktörler** doğuştan işitme kaybı vakalarının yaklaşık %50'sini oluşturmaktadır.
- Prematüre doğum ve doğumda oksijen eksikliği gibi nedenlerle **yeni doğan yoğun bakım ünitesinde (NICU) beş günden fazla kalınması.**
- **Gebelik esnasında yaşanan** sitomegalovirüs (CMV) gibi enfeksiyonlar gelişmekte olan iç kulağa zarar verebilir. Daha fazla bilgi için nationalcmv.org sitesini ziyaret edin.
- Bazı antibiyotikler ve diüretikler dâhil olmak üzere **ilaçlar** iç kulak için toksik olabilir.

Bebğinizin işitmesiyle ilgili sorularınız varsa bir sağlık uzmanıyla konuşun.



Bu broşürü şu dillerde bulmak için aşağıdaki karekodu kullanın:

English
Español
한국어
Türkçe

Polski
العربية
Português
kreyòl ayisyen

français
বাংলা
हिन्दी



New Jersey Erken İşitme Bozukluğu Tespiti ve Müdahalesi

nj.gov/health/fhs/nbs/ehdi

E-posta: EHDI@doh.nj.gov

Telefon: 609-292-5676

Faks: 609-633-7820

En geç
1
ay içinde
Tarama

En geç
3
ay içinde
Tanı

En geç
6
ay içinde
Erken Müdahale

NJHealth
New Jersey Department of Health



Yeni Doğan İşitme Taraması

New Jersey Erken İşitme Bozukluğu Tespiti ve Müdahalesi

NJHealth
New Jersey Department of Health

Erken İşitme Bozukluğu Tespiti ve Müdahalesi (EHDI)

EHDI “1-3-6” kılavuzlarını destekleyen ulusal bir halk sağlığı girişimidir:

- Her yeni doğan bebeğe **bir** aylık olmadan önce işitme kaybı taraması yaptırın
- İşitme taramasını geçemeyen bebeklerin **üç** aylık olmadan önce tam tanısal odyolojik değerlendirmeyi tamamlayın
- İşitme kaybı teşhisi konulan çocukların en geç **altı** aylıkken erken müdahale hizmetlerine kaydedilmesini sağlayın

İşitme kaybı olan bebeklerin yaklaşık %90'ı işitme sorunu olmayan ebeveynlerin çocuklarıdır.

Bebeğimin işitme taraması neden yapılmalıdır?

- New Jersey yasaları tüm yeni doğanlar için işitme taraması yapılmasını zorunlu kılmaktadır.
- Bebeklerin çoğu doğuştan iyi duyabilir, ancak bazıları duyamaz.
- İşitme kaybı erken tespit edilmeyen bebekler öğrenmekte zorluklar yaşayacaktır.
- İşitme taraması hızlı, güvenli ve ağrısızdır.
- Bebeğinizin işitme taraması sonuçlarını aldığınızda, gerekirse takip için öneriler sunulacaktır.

Normal işitme yetisine sahip bir bebeğin yapabildikleri:

Doğumdan 3 aya kadar:

- Ani, yüksek bir ses olduğunda gözlerini kırpar veya sıçrar
- Kendisiyle konuşulduğunda sessiz olur ve gülümser
- “Ohh” veya “ahh” gibi sesler çıkarır

3 ila 6 ay arası:

- Sesin geldiği yere gözleriyle bakar
- Sesler çıkartmaya başlar (baba, mama, gaga)
- Ciyaklama ve kıkırdama gibi pek çok ses çıkarır

6 ila 9 ay arası:

- Yüksek seslerin geldiği yere başını çevirir
- “No-no” veya “bye-bye” kelimelerini anlar
- Bazı kelimeleri mırıldanır (baba, mama, gaga)

9 ila 12 ay arası:

- Sizin söylediğini basit kelimeleri veya sesleri tekrarlar
- “Mama” veya “baba” kelimelerini düzgün bir şekilde kullanır
- Müzik veya şarkı söylendiğinde tepki verir
- Sorulduğunda en sevdiği oyuncakları ve nesneleri işaret eder

Çocuklar yaşamlarının ilk birkaç ayında konuşma ve dili öğrenmeye başlar. İşitme kaybı olan ve erken dönemde yardım alan çocuklar daha iyi dil becerileri geliştirir ve başarılı bir şekilde iletişim kurmayı öğrenir.

Bebeğimin neden başka bir işitme testine ihtiyacı var?

Bebeğiniz işitme taramasından geçemediyse, bazı sorularınız olabilir. Bazı bebekler için aşağıdaki nedenlerle başka bir test gerekebilir:

- Kulak içinde su olması
- Test yapılan odanın gürültülü olması
- Bebeğin çok fazla hareket etmesi
- Bebekte duyma kaybı olması

Bebeğiniz bir işitme testini geçemezse, mümkün olan en kısa sürede testi tekrarlayın. Başka bir işitme testine gerek duyulan bebeklerin çoğu normal işitse de, bazılarında işitme kaybı vardır.

Mümkün olan en kısa sürede tekrar işitme testi yaptırmak neden önemlidir?

Bebeğinizde işitme kaybı olup olmadığını anlamanın tek yolu işitme testidir. İşitme kaybı ne kadar erken bulunursa bu bebek için çok daha iyi olacaktır. Bebeğinizde işitme kaybı varsa, size yardımcı olabileceğimiz birçok yol vardır.

