

新泽西州猴痘疫苗接种

猴痘疫苗名为 JYNNEOS。


新泽西州目前的 JYNNEOS 疫苗供应量有限，以下居民可能有资格接种疫苗*。符合以下条件的人士：



已知在过去 14 天内与正痘病毒或猴痘病毒测试呈阳性的人士有过接触



过去 14 天内参加过已知发生猴痘暴露的活动




过去 14 天内在报告猴痘的地区有多个性伴侣

任何声明其资格（拥有多个性伴侣或参加发生过猴痘暴露的活动）的人士都有资格接种疫苗。

目前的疫苗接种工作重点面向受到较大影响的群体，包括男同性恋和双性恋男性，以及与男性发生性关系的其他男性。工作重点可能会随时间推移而改变。

*预计 CDC 会为新泽西州提供更多疫苗。随着新泽西州获得更多疫苗，该部门将继续扩大疫苗接种范围。

如需了解详情及查询疫苗接种地点，请访问
<https://bit.ly/njmpx>
或扫描二维码：



猴痘：
须知事项



猴痘是一种由病毒引起的感染。症状可能很轻微，但有些病例会较严重并需要住院治疗。

以下是保持安全及防止这种感染传播的须知事项。


猴痘有哪些症状？



相关症状可能包括：

- 生殖器或其他区域（如手足、面部或胸部）之上或周围可能出现皮疹、肿块或水疱
- 它们可能看起来类似于常见的性传播感染或其他皮疹，如带状疱疹或毒藤皮疹

- 出疹前可能会出现流感样症状，如发热、头部和身体疼痛、淋巴结肿大及发冷



猴痘如何传播？

猴痘通过人与人之间的密切身体接触传播，其中包括：



直接接触猴痘皮疹



在长时间的面对面接触或亲密身体接触期间接触粘液或唾液（唾沫），例如接吻、拥抱或性交时



触摸猴痘患者用过的物品，例如毛巾、床单和衣物

猴痘可从症状出现时开始传播，直到皮疹完全愈合并长出一层新的皮肤。

如何预防猴痘？



询问您的性伴侣是否有皮疹或其他猴痘症状



避免与有皮疹或其他猴痘症状的任何人士进行皮肤接触



避免接触被感染者用过的床上用品、毛巾、衣物或其他物品



与被感染者接触后，用肥皂和水彻底洗手，或使用含酒精的洗手液

如果我有相关症状或认为自己可能感染猴痘，该怎么办？

如果您有任何猴痘症状，请立即联系您的医疗服务提供者、急症护理中心或医院

- 在您前往就诊前致电，以便他们能够准备好将您与其他人隔离开来
- 请务必戴上口罩，并尽量遮盖病变部位
 - 请告知医疗服务提供者，您最近是否旅行过、是否与患有类似皮疹的人士或确诊患有猴痘的人士接触过
 - 如果您的医疗服务提供者建议测试，请接受测试；测试涉及采集皮疹拭子
 - 测试结果未出期间，请在家中隔离



如果测试结果呈阳性，该怎么办？



保持隔离，直到所有皮损消退、结痂脱落，并长出一层新的完好皮肤（通常需要 2-4 周）。



除非紧急情况或后续医疗护理需要外出，否则请待在家中。



在与其他人同住的情况下，尽可能使用单独的卫生间。



如果在家中需要与其他人待在一起，请佩戴贴合的口罩或防护面罩。



使用已在 EPA 登记的消毒剂定期清洁和消毒经常接触的表面。



用肥皂和水洗手，并使用酒精含量至少为 60% 的洗手液。



避免一切性行为。



避免与家中的其他人和宠物密切接触。



避免使用隐形眼镜，以防眼部感染。



避免对有水疱或皮损的身体部位剃毛，以防止病毒传播。

如果我认为自己已暴露于猴痘，该怎么办？



立即联系当地卫生部门



如果公共卫生官员建议，则接种疫苗



监测症状 21 天

