

원숭이두창 격리 지침

오소폭스바이러스 또는 원숭이두창 바이러스에 대해 양성 판정을 받은 사람들을 위한 지침.



모든 병변이 치료되고
딱지가 떨어지고, 정상
피부가 새로 나올 때까지
격리를 실시하십시오
(일반적으로 2-4주).



응급 상황이나 의학적 후속
치료를 위해 필요한 경우를
제외하고 외출하지 마십시오.



집에 같이 사는 사람이
있다면 가능하면 화장실을
따로 쓰십시오.



가정에서 다른 사람과 가까이
있어야 하는 경우, 잘 맞는
마스크를 착용하십시오.



미국 환경보호청
(Environmental Protection
Agency, EPA)에 등록된
소독제를 사용하여 손이
자주 닿는 면을 일상적으로
닦고 소독하십시오.



비누를 사용하여 물로
손을 씻고 알코올 함량이
최소 60%인 손소독제를
사용하십시오.



모든 성행위를 절제하십시오.



가정에서 다른 사람과
반려 동물과 밀접
접촉을 피하십시오.



눈 감염을 예방하기 위해
콘택트렌즈 사용을 피하십시오.



바이러스가 번지는 것을
방지하기 위해 수포나
병변이 있는 부위의 면도를
피하십시오.