# 원숭이두창: 밀접 접촉에 대한 Q&A

**얼마 동안 증상을 관찰해야 합니까?**
원숭이두창 감염자와 밀접 접촉 후 21일 동안 증상을 확인하십시오.

**체온을 얼마나 자주 재야 합니까?**
하루에 두 번(오전과 오후) 열을 확인하십시오.

**어떤 증상에 주의해야 합니까?**

- 100.4°F 이상의 고열
- 오한
- 새로 생긴 림프절 부종(목, 겨드랑이 또는 사타구니 주변)
- 새로 생긴 피부 발진

**열 또는 발진이 생기면 어떻게 해야 합니까?**
즉시 자가격리를 하고 지역 보건 당국에 연락하십시오.

**오한이나 림프절 부종만 있는 경우에는 어떻게 해야 합니까?**

- 24시간 자가격리를 하고 체온을 관찰하십시오.
- 열이나 발진이 있으면 즉시 지역 보건 당국에 연락하십시오.
- 열이나 발진은 없지만 오한이나 림프절 부종이 지속되면, 의료진에게 연락하십시오.

Centers for Disease Control and Prevention 자료 참조. 자세한 정보는 nj.gov/health/monkeypox를 참조하십시오.

2023년 5월 25일