

원숭이두창 격리 지침

원숭이두창 확진자를 위한 지침



모든 병변이 치료되고, 딱지가 떨어지고, 새살이 돌아날 때까지 격리하십시오(주로 2-4주).



응급 상황이나 후속 치료를 위해 필요한 경우 외에는 집에 머무르십시오.



가구 내에 함께 살고 있는 사람이 있으면 가능하면 서로 다른 욕실을 사용하십시오.



가정에서 다른 사람과 가까이 있어야 하는 경우, 잘 맞는 마스크를 착용하십시오.



미국 환경보호청(Environmental Protection Agency, EPA)에 등록된 소독제를 사용하여 손이 자주 닿는 면을 일상적으로 닦고 소독하십시오.



비누를 사용하여물로 손을 씻고 알코올 함량이 최소 60%인 손소독제를 사용하십시오.



모든 성행위를 절제하십시오.



가정에서 다른 사람과 반려 동물과 밀접 접촉을 피하십시오.



눈 감염을 예방하기 위해 콘택트렌즈 사용을 피하십시오.



바이러스가 번지는 것을 방지하기 위해 수포나 병변이 있는 부위의 면도를 피하십시오.



자료 참조, [미국 질병통제예방센터](https://www.cdc.gov/mmwr).

자세한 정보는 nj.gov/health/cd/topics/monkeypox.shtml을 참조하십시오.