

원숭이두창과 성 건강: 알아야 할 사항

원숭이두창은 바이러스에 의한 감염병입니다. 증상은 경미할 수 있지만, 일부 사례에서는 중증이 되어 입원 치료가 필요할 수 있습니다. 다음은 이 감염병의 확산을 예방하고 안전을 지키기 위해 알아야 할 사항입니다.

원숭이두창의 증상은 무엇입니까?

다음과 같은 증상이 있습니다.

- 발진, 부종, 수포가 생식기 주변 또는 다른 부위(손, 발, 얼굴, 가슴 등)에 발생합니다. 흔한 성 감염병 또는 대상포진이나 옷나무 피부염과 같은 피부 발진과 비슷해 보일 수 있습니다.
- 발진이 생기기 전에 발열, 두통 및 전신통, 림프절 부종 및 오한 등 독감과 같은 증상이 발생할 수 있습니다.

원숭이두창은 어떻게 전파될까요?

원숭이두창은 사람들 간에 다음과 같은 직접적인 밀접 접촉에 의해 전파됩니다.

- 원숭이두창 발진에 직접 접촉
- 장시간 대면 접촉에 의한 호흡기 비말 또는 구강 타액과 접촉
- 원숭이두창 감염자가 사용한, 수건, 침구, 의류 등의 물건이나 천 접촉



원숭이두창 증상이 있거나 감염이 의심될 경우 어떻게 해야 합니까?

원숭이두창 증상이 있으면 의료 제공자, 긴급 진료 센터 또는 병원으로 즉시 연락하십시오. 감염자를 다른 사람으로부터 격리할 준비를 할 수 있도록 방문 전에 먼저 전화를 하십시오. 반드시 마스크를 착용하십시오. 최근에 여행을 했거나 유사한 발진이 있는 사람 또는 원숭이두창으로 진단받은 사람과 접촉한 적이 있으면 의료진에게 알려십시오.

원숭이두창은 어떻게 예방할 수 있습니까?

- 성관계 파트너에게 발진이나 기타의 원숭이두창 증상이 있는지 물어보십시오.
- 발진이나 다른 원숭이두창 증상이 있는 사람과 피부 접촉을 피하십시오.
- 증상이 있으면 의료진에게 연락하십시오.
- 감염자가 사용한 침구, 의류 또는 그 밖의 물건과 접촉을 피하십시오.
- 감염자를 감염 위험이 있는 사람으로부터 격리하십시오.
- 감염자와 접촉한 후 비누와 물로 손을 잘 씻거나 알코올 성분의 손 소독제를 사용하십시오.

자세한 정보는 <https://bit.ly/njmpx>를 방문하거나
QR 코드를 스캔하세요:



스캔하세요