

Szczepienie przeciw małpiej ospie (hMPXV) w New Jersey

Szczepionka przeciwko wirusowi ludzkiej małpiej ospy (hMPXV) nazywa się JYNNEOS. Następujący mieszkańcy New Jersey mogą kwalifikować się do otrzymania szczepienia:



Osoby, które wiedzą, że w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z kimś, kto uzyskał pozytywny wynik testu na ortopokswirusa lub wirusa małpiej ospy (hMPXV)

(Skontaktuj się ze swoim lokalnym ośrodkiem medycznym w celu koordynacji szczepienia)

- Mężczyźni o orientacji homoseksualnej, biseksualnej oraz pozostali mężczyźni utrzymujący stosunki seksualne z mężczyznami, osoby transpłciowe lub niebinarne, w przypadku których przez ostatnie 6 miesięcy:



- postawiono nową diagnozę w związku z jedną lub więcej niż jedną chorobą przenoszoną drogą płciową podlegającą notyfikacji (tj. ostra forma HIV, wrzód weneryczny, chlamydia, rzeżączka, lub syfilis)
- Osoby, które mają więcej niż jednego partnera seksualnego

- Osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy:
 - Odbyły stosunek seksualny w komercyjnym lokalu przeznaczonym do spotkań partnerów seksualnych
 - Odbyły stosunek podczas uczestnictwa w dużym wydarzeniu publicznym, które miało miejsce w obszarze geograficznym, gdzie występują zakażenia małpiałą ospą (hMPXV)
- Były partnerami seksualnymi osób narażonych na ww. zagrożenia
- Osoby, które spodziewają się wystąpienia powyższych zagrożeń

Odwiedź punkt szczepień
(zeskanuj kod QR na odwrocie, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie szczepień)

Osoby z wybranych grup ryzyka narażenia zawodowego, np.:



- Personel laboratoriów badawczych pracujący z ortopokswirusami
- Personel laboratoriów klinicznych wykonujący testy diagnostyczne na obecność ortopokswirusów
- Zespoły personelu medycznego ds. reagowania na ortopokswirusy, które to zespoły są wyznaczone przez odpowiednie organy publicznej opieki zdrowotnej i służby antyterrorystyczne

(Skonsultuj się ze swoim lokalnym ośrodkiem medycznym)

Ośrodek medyczny NJ otrzymuje szczepionki przeciwko małpiej ospie (hMPXV) od rządu federalnego, które są dostarczane bezpłatnie osobom kwalifikującym się do otrzymania szczepienia.


Bieżący program szczepień skupia się na grupach w nieproporcjonalny sposób narażonych na zakażenie, w tym na mężczyznach o orientacji homoseksualnej i biseksualnej oraz innych mężczyznach utrzymujących stosunki seksualne z mężczyznami.
To może się z czasem zmienić.

Uzyskaj aktualne informacje o osobach kwalifikujących się do otrzymania szczepienia i punktach szczepień.

Odwiedź stronę <https://bit.ly/njmpx> lub zeskanuj kod QR:



NJ Health
New Jersey Department of Health



**WIRUS MAŁPIEJ OSPY
(hMPXV)**

Co należy wiedzieć?

Ludzka małpia ospa, nazywana także hMPXV, to infekcja wywołana wirusem. Objawy mogą być łagodne, ale w niektórych przypadkach mogą ulec zaostrzeniu, a pacjent może wymagać hospitalizacji.

Co należy wiedzieć, aby zachować bezpieczeństwo i zapobiegać rozprzestrzenianiu się infekcji.

Jakie są objawy małpiej ospy (hMPXV)?



Objawy obejmują:

- Wysypkę, guzy lub pęcherze, które mogą pojawiać się na genitaliach lub w innych miejscach na ciele (na przykład na rękach, stopach, twarzy lub klatce piersiowej)
- Mogą wyglądać podobnie do innych infekcji przekazywanych drogą płciową lub do innej wysypki skórnej, takiej jak półpasiec lub wysypka po kontakcie z trującym bluszczem

- Przed wysypką mogą wystąpić objawy podobne do grypowych, takie jak gorączka, ból głowy i ciała, opuchnięcie węzłów chłonnych i dreszcze




Jak małpia ospa się rozprzestrzenia (hMPXV)?

Małpia ospa (hMPXV) rozprzestrzenia się przez bliski kontakt fizyczny pomiędzy ludźmi, na przykład:



Bezpośredni kontakt z wysypką małpiej ospy (hMPXV)



Śluz lub ślinę (wyplutą) w trakcie długiego kontaktu twarzą w twarz lub intymnego kontaktu fizycznego, jak na przykład pocałunek, przytulenie lub seks



Dotykanie przedmiotów używanych przez osobę zakażoną małpią ospą (hMPXV) takich jak ręczniki, pościel i ubrania

Małpia ospa (hMPXV) jest zaraźliwa od momentu pojawienia się objawów aż do całkowitego wyleczenia wysypki i wytworzenia świeżej warstwy skóry.

Jak zapobiegać zarażeniu wirusem małpiej ospy (hMPXV)?



Zapytaj swoich partnerów seksualnych, czy występuje u nich wysypka lub inne objawy małpiej ospy (hMPXV)



Unikaj kontaktu skóra do skóry z kimkolwiek, kto ma wysypkę lub inne objawy małpiej ospy (hMPXV)



Unikaj kontaktu z materiałami takimi jak pościel, ręczniki, ubrania lub innymi przedmiotami używanymi przez zarażoną osobę



Po kontakcie z zarażoną osobą umyj porządnie ręce mydłem i wodą lub użyj substancji dezynfekującej na bazie alkoholu

Co robić, jeśli mam objawy lub sądzę, że mam małpią ospę (hMPXV)?

Jeśli masz objawy małpiej ospy (hMPXV), natychmiast skontaktuj się z lekarzem, oddziałem ratunkowym lub szpitalem

- Przed przyjściem zadzwoń, aby personel przygotował się na odizolowanie Cię od innych osób
- Pamiętaj o masce i w największym możliwym stopniu zakryj zmiany
- Powiadom swojego lekarza, jeśli niedawno podróżowałeś(-aś), miałeś(-aś) kontakt z osobą z podobną wysypką lub kimś, u kogo zdiagnozowano małpią ospę (hMPXV)
- Wykonaj test, jeśli jest zalecony przez Twojego lekarza; test polega na pobraniu próbki z wysypki na wacik
- Jeśli czekasz na wynik testu, izoluj się w domu.



Co robić, jeśli uzyskam pozytywny wynik testu?

- ✓ Izoluj się aż do ustąpienia zmian, odpadnięcia strupów i wytworzenia świeżej warstwy nienaruszonej skóry (zazwyczaj 2–4 tygodnie).
- ✓ Pozostań w domu, chyba że nastąpiła nagła sytuacja lub musisz udać się na kontrolę medyczną.
- ✓ Jeśli to możliwe, korzystaj z osobnej łazienki, jeśli w Twoim domu mieszkają inne osoby.
- ✓ Noś dobrze dopasowaną maskę chirurgiczną lub z filtrem, jeśli przebywasz w domu z innymi osobami.
- ✓ Rutynowo czyść i dezynfekuj często dotykane powierzchnie za pomocą substancji dezynfekującej zarejestrowanej w Agencji Ochrony Środowiska (EPA).
- ✓ Myj ręce mydłem i wodą i używaj substancji dezynfekującej z minimalną zawartością alkoholu 60%.
- ✗ Powstrzymaj się od jakiegokolwiek aktywności seksualnej.
- ✗ Unikaj bliskiego kontaktu z innymi osobami i zwierzętami w domu.
- ✗ Unikaj używania soczewek, aby zapobiec infekcji oczu.
- ✗ Unikaj golenia obszarów na ciele z pęcherzami lub zmianami, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa.

Co mam robić, jeśli sądzę, że miałem(-am) kontakt z małpią ospą (hMPXV)?



Natychmiast skontaktuj się z lokalnym ośrodkiem medycznym



Jeśli zaleci to medyk, zaszczep się



Obserwuj objawy przez 21 dni

